

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTI-RABIQUE

- Le traitement antirabique doit être mis en place immédiatement et systématiquement chez toute personne mordue par un animal qu'il soit domestique ou sauvage
- Il ne faut jamais reporter la sérovaccinothérapie parce que l'animal apparaît sain ou que les propriétaires affirment qu'il est vacciné et / ou présentent un certificat de vaccination
- Beaucoup de fausses déclarations ont entraîné la mort de personnes mordues faute de vaccinothérapie
- Le traitement peut être interrompu si l'animal reste sain après une période d'observation de quinze jours
- Le traitement doit débuter le plus tôt possible après l'exposition et ne doit en aucun cas être refusé à une personne exposée quelque soit le temps écoulé depuis le contact
- Seul le respect strict des primovaccinations et des rappels peut sauver la vie de la personne mordue. Il ne faut surtout pas interrompre la vaccination une fois commencée
- L'Institut Pasteur commercialise deux types de vaccins :
 - Les vaccins préparés sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés
 - Les vaccins préparés sur cultures cellulaires
- Le protocole vaccinal recommandé dépend du type de vaccin utilisé



COMMENT NE PAS MOURIR DE LA RAGE

- La rage est une maladie virale aigue répandue dans le monde entier. Une fois déclarée, le taux de létalité est de 100%. Seule la sérovaccination appliquée avec le schéma strict après morsure peut sauver la vie d'une personne infectée.
- Transmise par l'intermédiaire de sécrétions infectées par le virus, elle est généralement contractée à l'homme par la morsure ou la griffure d'un animal atteint de rage, le plus fréquemment des animaux domestiques tels que les chiens et les chats. La période d'incubation suivant l'exposition est variable mais lorsque les symptômes cliniques apparaissent la mort est inévitable.
 - La rage peut se présenter chez l'être humain sous deux formes : La forme furieuse (ou spastique) et la forme paralytique (ou silencieuse). La première forme plus courante est associée au tableau clinique classique, qui comprend l'hydrophobie et/ ou l'aérophobie. La plupart des patients meurent quelques jours après l'apparition des symptômes. La rage paralytique est moins fréquente. Elle associe une paresthésie locale à une paralysie flasque évolutive.
- Quelque soit son tableau clinique, une fois qu'elle se manifeste la rage est toujours mortelle.

Seule la vaccination peut protéger contre cette maladie



TRANSMISSION

Elle se fait au contact des matières d'animaux enrégés, suivantes:

- Salive
- Tissus (système nerveux, sang, glandes salivaires)
- Urine, fèces, sueurs, larmes, mucus nasal ont un rôle minime dans la transmission

MODE DE TRANSMISSION

- Morsure : la plus fréquente +++
- Griffure
- Contact avec la peau lésée (léchage)
- Blessure par un objet souillé (en cas d'abattage), projection de bave dans les yeux
- Inhalation (Chauve-souris)



PROPHYLAXIE MEDICALE

Que faire lorsque l'on craint d'avoir été contaminé?

- Laver le plus vite possible la plaie à grande eau, n'ayez pas peur de savonner au savon de Marseille
- Désinfecter la plaie à l'alcool ou de l'eau javellisée à 12°
- Mettre un linge propre sur la plaie et se diriger de toute urgence vers la structure de santé la plus proche ou vers une unité d'urgence pour bénéficier de la vaccination ou la sérovaccination antirabique ainsi que des soins pour la plaie.

