

**MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA
POPULATION**

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

**REGISTRE
Des Tumeurs d'Alger**

ANNEES 2008 – 2009 – 2010

EQUIPE DU REGISTRE

- PR.D. HAMMOUDA, épidémiologiste : responsable du registre.
- Dr S.MAARAF médecin généraliste. Administrateur du registre
- C. KADRI ingénieur d'état en biologie : recueil des données, codage et saisie des données.
- K. BOUZERAR, M. NAMAOU, L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI :

Techniciens supérieurs de la santé : recueil des données, codage et saisie des données.

Analyse des données et rédaction du bulletin :

Pr D. Hammouda et Dr S. Maaraf

Responsable de l'Anatomie pathologique :

Professeur A. BOUHADEF, chef de service du laboratoire d'Anatomie pathologique, Hôpital Parnet, Centre hospitalo-Universitaire Alger-Est.

Ce bulletin analyse les données recueillies par le registre des tumeurs d'Alger pour les années 2008 et 2009. Il porte sur les cas survenus dans la population d'Alger mais aussi, pour la première fois, sur ceux recueillis pour les populations de Boumerdes et de Tipaza pour les

mêmes années. La précédente expérience d'élargissement du recueil des données d'incidence des cancers aux wilayas limitrophes, a porté sur Blida et Tizi Ouzou. Elle s'est avérée concluante dans la mesure où elle nous a permis de mieux identifier les malades donnant une fausse adresse à Alger. Après avoir mis en place, recueilli, analysé et publié les données de ces deux wilayas à partir d'Alger de 1997 à 2003, l'activité a été confiée aux services d'Epidémiologie des CHU de Blida et de Tizi Ouzou qui ont continué et amélioré l'enregistrement et l'analyse des nouveaux cas de cancers survenus dans leurs wilayas respectives. Nous réitérons l'expérience avec ces deux nouvelles wilayas avec le même objectif d'amélioration de la mesure de l'incidence dans la wilaya d'Alger. Le travail de mise en place de registres dans ces deux wilayas a été, pour de multiples raisons, plus long et plus difficile que pour Blida et Tizi Ouzou ce qui explique le retard pris par notre publication annuelle ; retard que nous sommes en train de résorber. Les données recueillies pour ces wilayas sont, elles, très perfectibles mais nous avons choisi de les publier, d'abord parce qu'elles reflètent une somme de travail importante et aussi parce qu'elles montrent un profil intéressant de la morbidité cancéreuse dans ces wilayas. Par contre, nous attendrons d'avoir quelques années de recul avant de les commenter, tant les indicateurs en général et les indicateurs d'incidence, en particulier, n'ont de signification que lorsqu'ils permettent de dessiner des tendances.

Quant au profil épidémiologique du cancer dans la wilaya d'Alger, nous constatons quelques caractéristiques particulières :

- une augmentation de l'incidence brute des cancers avec près de 143 nouveaux cas pour 100.00 hommes et 192 pour 100.000 femmes en 2009. Cette augmentation est cohérente avec l'évolution générale des caractéristiques de la démographie algérienne : augmentation de l'espérance de vie, exposition plus longue et plus importante aux facteurs de risque environnementaux, augmentation de la sédentarité, modifications, voire mutations, des modes de vie, citadins en particulier, moyens diagnostics plus importants. Citons pour comparaison le taux européen d'incidence des cancers qui est de 436 nouveaux cas pour 100.000. Ce taux est significativement différent selon les pays d'Europe : Il va de 495 pour 100.000, taux le plus élevé, enregistré en Suède à 198.5 pour 100.000 au Portugal et 187.8 pour 100.000 en Grèce.
- La progression de l'incidence du cancer du sein prend des proportions très préoccupantes. Avec plus de 1300 nouveaux cas en 2009, soit 84 nouveaux cas pour 100.000 femmes, Alger se situe à un niveau d'incidence qui reste encore en dessous de la moyenne mondiale telle que donnée par l'OMS (88.9 nouveaux cas pour 100.000 femmes), mais proche de celles enregistrées dans les pays d'Europe du Sud tels que Nicosie (90 nouveaux cas pour 100.000 femmes), Lisbonne (90.9) ou encore Barcelone (95.6). Ils demeurent loin derrière ceux enregistrés en France (101.5 nouveaux cas pour 100.000 femmes) ou encore en Belgique (138 nouveaux cas pour 100.000).
- Les cancers du poumon (plus de 20 nouveaux cas pour 100.000 hommes) et de la vessie (plus de 14 nouveaux cas pour 100.000 hommes) connaissent une progression constante et posent une fois de plus l'urgence de la mise en place d'un programme antitabac;
- Les cancers du côlon rectum, quatrième localisation chez l'homme et deuxième chez la femme, connaissent une progression constante et ininterrompue depuis le milieu des années 2000;

- Le cancer de la prostate, devenu 3ème cancer chez l'homme, est appelé à prendre un poids toujours croissant avec l'allongement de l'espérance de vie ;
- Le cancer de la thyroïde, devenu depuis quelques années déjà, troisième cancer féminin, nécessite une étude sur ses facteurs de risque en Algérie. Il devrait aussi bénéficier d'un enregistrement à part en raison de la progression notable de son incidence durant la dernière décennie ;
- Il faut noter enfin la diminution notable de l'incidence brute du cancer du col de l'utérus (qui n'est pas, faut-il le rappeler, une maladie sexuellement transmissible). Cette diminution s'est amorcée, dans la wilaya d'Alger, il y a quelques années déjà. Elle pourrait s'expliquer, entre autres facteurs, par l'augmentation notable du célibat féminin rapporté par les derniers recensements de la population et par l'effondrement de la parité enregistré durant cette dernière décennie. Il sera particulièrement intéressant, d'une part, de savoir si les autres registres constatent la même tendance, d'autre part de rester attentif à l'évolution de la courbe d'incidence de ce cancer et, si cette diminution est confirmée, d'en rechercher les causes.

Population d'Alger : année 2008

Population totale : 3.040.772

Nombre des hommes : 1.532.549 soit 50.4% de la population

Nombre des femmes : 1.508.223 soit 49.6% de la population

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	147.125	140.868
5-9	132.565	127.294
10-14	150.803	145.393
15-19	167.967	162.737
20-24	171.645	166.659
25-29	153.715	150.219
30-34	127.661	126.691
35-39	108.351	108.140
40-44	895.01	889.85
45-49	712.63	713.39
50-54	591.56	580.67
55-59	439.84	437.38
60-64	312.64	328.79
65-69	263.60	282.04
70-74	220.69	242.82
+75	288.12	315.22
Total	1.532.549	1.508.223

➤ Plus de 60 ans :

- 7.1 % des hommes
- 7.8 % des femmes

➤ Moins de 20 ans :

- 39.05% des hommes
- 38.2% des femmes

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES DANS LA WILAYA D'ALGER EN 2008

Caractéristiques générales des cancers dans la wilaya d'Alger

- 4409 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés :
- 1986 cas chez l'homme : 45% des tumeurs malignes enregistrées dans l'année.
- 2423 cas chez la femme : 55% des cas.
- Le Sexe ratio est de 0.81

- Proportions de cas confirmés histologiquement :

	<i>Pathologie de tumeur primitive</i>	<i>Pathologie de métastase</i>
Hommes	86.4%	3.8%
Femmes	86.9%	3.3%

➤ LES CANCERS CHEZ L'HOMME

- 1894 nouveaux cas de cancers masculins, basocellulaires exclus ;
- 72 cas de cancers sont d'âge inconnu (3.6%),
- 1.5% des cancers masculins ont été notifiés par certificats de décès uniquement


- Répartition des cas par tranche d'âge :

<i>Tranches d'âges</i>	<i>•</i>	<i>Fréquences</i>	<i>•</i>	<i>%</i>	<i>% cumulés</i>
• 0-4	•	32	•	1.6	• 1.6
• 5-9	•	27	•	1.4	• 3

• 10-14	• 20	• 1	• 4
• 15-19	• 28	• 1.4	• 5.4
• 20-24	• 30	• 1.5	• 6.9
• 25-29	• 41	• 2.1	• 9
• 30-34	• 48	• 2.4	• 11.4
• 35-39	• 73	• 3.7	• 15.1
• 40-44	• 114	• 5.7	• 20.8
• 45-49	• 110	• 5.5	• 26.3
• 50-54	• 162	• 8.2	• 34.5
• 55-59	• 194	• 9.8	• 44.3
• 60-64	• 225	• 11.3	• 55.6
• 65-69	• 249	• 12.5	• 68.1
• 70-74	• 223	• 11.2	• 79.4
• 75+	• 338	• 17	• 96.4
• Age inconnu	• 72	• 3.6	
• Total	• 1986	• 100	

- L'âge médian de survenue des cancers, tous sites confondus, est de 60 ans


Cancers Homme: répartition par tranches d'âges - Alger 2008



Incidences brutes et incidences standardisées les plus élevées chez les hommes en 2008 :

Localisation	effectifs	Fréquence Relative %	Incidence brute	Incidence standardisée
--------------	-----------	-------------------------	-----------------	---------------------------

Poumon	296	15	19.3	27.8
Vessie	223	11.2	14.5	18.3
Prostate	195	9.8	12.7	16.9
Colon-rectum	192	9.7	12.5	16.1
Estomac	97	4.9	6.3	7.8
Système hématopoïétique	96	4.8	6.3	6.2
Cerveau	91	4.6	5.9	7.2
Peau	91	4.6	5.9	15.1
Rhino pharynx	50	2.5	3.2	4.7
Pancréas	42	2.1	2.7	4
Larynx	41	2.1	2.7	4



Cancers les plus fréquents chez l'homme
Alger 2008

Ces données consolident les tendances de l'incidence déjà constatées à Alger :

- Les cancers liés au tabagisme, cancer du poumon et cancers de la vessie, sont au premier rang des cancers masculins. Leur incidence est en augmentation constante.

En 2007, le taux d'incidence brute du cancer du poumon était de 16.5 nouveaux cas pour 100.000 hommes et celui du cancer de la vessie est de 9.8 ;


- Le cancer de la prostate connaît, depuis le début des années 2004, une augmentation rapide de son incidence. Il passe en une année d'une incidence de 10 à 16 nouveaux cas pour 100.000 hommes est le troisième cancer de l'homme. Dans quelques années, ce cancer est appelé à devenir le premier cancer masculin et à être un problème important de santé publique, comme cela se voit, depuis une décennie déjà, dans les pays occidentaux.
- Les cancers digestifs, colon rectum et estomac, parmi les cinq premiers cancers masculins, connaissant un développement important depuis près d'une décennie.

➤ LES CANCERS CHEZ LA FEMME

- ✓ 2423 nouveaux cas, soit 55% des tumeurs malignes diagnostiquées dans l'année,
- ✓ l'âge médian est à 50 ans, soit 10 ans avant les hommes
- ✓ 39 cas sont d'âge inconnu (1.6%) ;
- ✓ 0.9% des cas ont été notifiés sur certificats de décès uniquement.

- Répartition des cas par tranche d'âge :


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 0-4	•	12	•	0.5	•	0.5
• 5-9	•	12	•	0.5	•	1
• 10-14	•	17	•	0.7	•	1.7
• 15-19	•	23	•	0.9	•	2.6
• 20-24	•	31	•	1.3	•	3.9
• 25-29	•	66	•	2.7	•	6.6
• 30-34	•	125	•	5.2	•	11.8
• 35-39	•	195	•	8	•	19.9
• 40-44	•	304	•	12.5	•	32.4
• 45-49	•	292	•	12.1	•	44.4
• 50-54	•	270	•	11.1	•	55.6
• 55-59	•	233	•	9.6	•	65.2
• 60-64	•	220	•	9.1	•	74.3
• 65-69	•	202	•	8.3	•	82.6
• 70-74	•	167	•	6.9	•	89.5
• 75+	•	215	•	8.9	•	98.4
• Age inconnu	•	39	•	1.6		100
• Total	•	2423	•	100		



**Cancers chez la femme : répartition par tranches d'âges
Alger 2008**

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les femmes en 2008 :

<i>localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence relative%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standard</i>
Sein	942	38.9	62.4	73.5
Colon-rectum	176	7.3	11.7	3.4
Thyroïde	158	6.5	10.5	11.5
Col utérin	128	5.3	8.5	10.9
ovaire	99	4.1	6.6	8.1
Estomac	87	3.6	5.8	7.1
Peau	57	2.4	3.8	8.7
poumon	53	2.2	3.5	4.4
Système hématopoïétique	48	2	3.2	3.6
Vésicule biliaire	41	1.7	2.7	3.8




**Cancers les plus fréquents chez la femme
Alger 2008**

- L'incidence brute du cancer du sein, qui a dépassé 60 nouveaux cas pour 100.000 femmes, se rapproche de l'incidence enregistrée en Europe du sud (Espagne, Portugal). Cette progression continue de l'incidence, depuis plus de dix ans, appelle à une organisation urgente d'un programme de dépistage et de diagnostic précoce de ce cancer
- A l'inverse, l'incidence du cancer du col de l'utérus connaît une régression notable depuis quelques années. En 2008, il est le quatrième cancer féminin après avoir occupé la deuxième puis la troisième place parmi les cancers de la femme. Il sera intéressant de surveiller cette évolution afin de savoir s'il s'agit d'une tendance lourde et définitive et de comparer avec les incidences constatées par les autres registres du cancer algériens.
- Le cancer du colon-rectum, deuxième cancer féminin et quatrième cancer masculin nécessite une attention soutenue par le poids spécifique qu'il prend dans l'ensemble de la pathologie cancéreuse.
- Enfin, le cancer de la thyroïde, dont la fréquence chez les femmes augmente rapidement, justifierait de la mise en place d'un registre régional pour une meilleure connaissance de ses facteurs de risques.

➤ Le cancer du sein féminin

Effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 15-19	•	1	•	0.1	•	0.1
• 20-24	•	1	•	0.1	•	0.2
• 25-29	•	21	•	2.2	•	2.4
• 30-34	•	62	•	6.6	•	9
• 35-39	•	102	•	10.8	•	19.9
• 40-44	•	172	•	18.3	•	38.1
• 45-49	•	161	•	17.1	•	55.2
• 50-54	•	118	•	12.5	•	67.7
• 55-59	•	86	•	9.1	•	76.9
• 60-64	•	77	•	8.2	•	85
• 65-69	•	56	•	5.9	•	91
• 70-74	•	44	•	4.7	•	95.6
• 75+	•	29	•	3.1	•	98.7
• Age inconnu	•	12	•	1.3	•	100
• Total	•	942	•	100		



Cancer du sein féminin Incidences brutes par tranches d'âges
Alger 2008

L'incidence de ce cancer commence tôt dans la vie des femmes. Le plus grand nombre de cas est enregistré entre 39 et 54 ans, bien que l'âge médian de ce cancer ait reculé, passant de 45 ans à 49 ans. A partir de 70 ans, l'incidence de ce cancer diminue puis s'effondre. L'augmentation rapide de l'incidence de ce cancer est un fait mondial. L'OMS estime son incidence moyenne mondiale à 88 nouveaux cas pour 100.000 femmes.

➤ **LES CANCERS CHEZ L'ENFANT**

- 77 nouveaux cas de cancers chez les garçons de 0-15 ans (3.9% des cancers) et 42 cas chez les filles (1.7%)
 - 64.7% des cancers de l'enfant sont masculins.
- **Incidences brutes et standardisées les plus fréquentes observées chez les garçons moins de 15 ans :**

Localisation	Effectifs	Fréquence%	Incidence brute	Incidence standardisée
Hémopathies malignes	38	48.1	8.8	2.8
Cerveau	19	24.1	4.4	1.5

Incidences brutes et standardisées les plus fréquentes observées chez les filles moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence%	Incidence brute	Incidence standardisée
Hémopathies malignes	14	34.2	3.4	1
Cerveau	10	24.4	2.4	0.7

Comme ailleurs dans le monde, les cancers de l'enfant ne constituent que sont peu fréquents : 2.7% des cancers de l'adulte et près des deux-tiers d'entre eux surviennent chez le garçon. Les localisations qui connaissent les incidences les plus élevées dans les deux sexes sont les hémopathies malignes et les cancers de l'encéphale.

POPULATION DE BOUMERDES : Année 2008

Population totale : 802.083

Nombre des hommes : 404.2050

Nombre des femmes : 397.833

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	388.13	371.78
5-9	349.72	335.97
10-14	397.83	383.71
15-19	443.11	429.46
20-24	452.81	439.80
25-29	405.51	396.44
30-34	336.79	334.38
35-39	285.85	285.45
40-44	236.13	234.92
45-49	188.02	188.37
50-54	156.09	153.36
55-59	116.07	115.57
60-64	8252	8693
65-69	6959	7459
70-74	5827	6425
+75	7606	8335
Total	404.250	397.833

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2008 DANS LA WILAYA DE BOUMERDES :

Caractéristiques générales des cancers

- 417 nouveaux cas de cancers ont été notifiés pour l'année 2008 dans la wilaya de Boumerdes
- 202 nouveaux cas masculins et 215 cas féminins
- Le sex ratio est de 0.93

Proportions de cas confirmés histologiquement :


	<i>Pathologie de tumeur primitive</i>	<i>Pathologie de métastase</i>
Hommes	86.1%	2.3%
Femmes	89.8%	0.5%

➤ **LES CANCERS CHEZ LES HOMMES:**

- 202 nouveaux cas : 48.4% des tumeurs.
- 6 cas sont d'âge inconnu (3%)
- 1 % des cas notifiés sur certificat de décès uniquement chez les hommes

• **Répartition des cas par tranche d'âge :**

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 0-4	•	4	•	2	•	2
• 5-9	•	2	•	1	•	3
• 10-14	•	4	•	2	•	5
• 15-19	•	3	•	1.5	•	6.4
• 20-24	•	10	•	5	•	11.4
• 25-29	•	7	•	3.5	•	14.9
• 30-34	•	5	•	2.5	•	17.3
• 35-39	•	9	•	4.5	•	21.8
• 40-44	•	3	•	1.5	•	23.3
• 45-49	•	14	•	6.9	•	30.2
• 50-54	•	30	•	14.9	•	45
• 55-59	•	17	•	8.4	•	53.5
• 60-64	•	27	•	13.4	•	66.8
• 65-69	•	18	•	8.9	•	75.7
• 70-74	•	22	•	10.9	•	86.6
• 75+	•	21	•	10.4	•	97
• Age inconnu	•	6	•	3		
• Total	•	202	•	100		




**Cancers Hommes : incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes 2008**

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les hommes en 2008 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	30	14.9	14.9	7.4	10.6
Colon-rectum	30	14.8	29.7	7.4	10.7
Vessie	19	9.4	39.1	4.7	5.3
Estomac	17	8.4	47.5	4.2	5.1
cerveau	14	6.9	54.4	3.5	3.9
Peau	12	6	60.4	3	4.6
Système hémato poïétique	11	5.4	65.8	2.7	3.2
Pancréas	6	3	68.8	1.5	2.1
Rein	5	2.5	71.3	1.2	1.9
Larynx	4	2	73.3	1	1.1

Les fréquences relatives des principales localisations des cancers sont identiques à celles observées dans la wilaya d'Alger. Les cancers associés aux tabagismes ainsi que les cancers digestifs sont les plus fréquents. Le cancer de la prostate n'apparaît pas parmi les cancers les plus fréquents : est-ce un biais de recrutement ou une caractéristique particulière de cette wilaya ?




**Cancers les plus fréquents chez l'homme
Boumerdes 2008**

➤ **LES CANCERS CHEZ LES FEMMES :**

- 215 nouveaux cas : 51.5% des tumeurs.
- 6 cas d'âge inconnu (2.6%)
- 0 cas notifiés sur certificat de décès

➤ **Répartition par tranches d'âge :**


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 0-4	•	2	•	0.9	•	0.9
• 5-9	•	1	•	0.5	•	1.4
• 10-14	•	3	•	1.4	•	2.8
• 15-19	•	5	•	2.3	•	5.1
• 20-24	•	4	•	1.9	•	7
• 25-29	•	7	•	3.3	•	10.2
• 30-34	•	7	•	3.3	•	13.5
• 35-39	•	17	•	7.9	•	21.4
• 40-44	•	16	•	7.4	•	28.8
• 45-49	•	23	•	10.7	•	39.5
• 50-54	•	18	•	8.4	•	47.9
• 55-59	•	22	•	10.2	•	58.1
• 60-64	•	17	•	7.9	•	66
• 65-69	•	24	•	11.2	•	77.2
• 70-74	•	21	•	9.8	•	87
• 75+	•	24	•	11.2	•	98.1
• Age inconnu	•	4	•	1.9	•	100
• Total	•	215	•	100		



Cancers Femmes: incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes 2008

Incidences brutes et incidences standardisées les plus élevées chez les femmes en 2008 :


localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	57	26.5	26.5	14.3	16.7
Colon-rectum	20	9.3	35.8	5	5.6
Col utérin	14	6.5	42.3	3.5	4.8
Lymphomes	12	5.6	47.9	3	3.3
Thyroïde	11	5.1	53	2.7	3.6
Système hématopoïétique	11	5.1	58.1	2.7	2.7
Ovaire	7	3.3	61.4	1.7	2.4
Vessie	6	2.8	64.2	1.5	2.3
Estomac	5	2.3	66.5	1.2	1.7
Pancréas	5	2.3	68.8	1.2	1.3



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Boumerdes 2008**

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

Tranches d'âges	Effectifs	%	% cumulés
30-34	3	5.3	5.3
35-39	11	19.3	24.6
40-44	8	14	38.6
45-49	11	19.3	57.9
50-54	2	3.5	61.4
55-59	6	10.5	71.9
60-64	5	8.8	80.7
65-69	3	5.3	86
70-74	3	5.3	91.2
75+	5	8.8	100
Total	57	100	



**Cancer du sein féminin: Incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes2008**

Le cancer du sein est la première localisation cancéreuse féminine dans la wilaya de Boumerdes ;

Son incidence est basse en comparaison avec celle enregistrée à Alger ;

L'âge médian est, quant à lui identique à celui enregistré par l'ensemble des registres du cancer algériens.

➤ **LES CANCERS DE L'ENFANT**

- 16 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez l'enfant en 2008, soit 3.8% des cancers
- 10 cas sont survenus chez les garçons (4.9% des cancers masculins)
- 6 cas chez les filles (2.8% des cancers féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de boumerdes chez les garçons moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence %	Incidence brute	Incidence standardisée
Hémopathies malignes	5	50	4.4	1.3
Cerveau	3	30	2.6	0.8

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de boumerdes chez les filles moins de 15 ans :

Localisation	effectifs	fréquence	Incidence brute	Incidence standardisée
Hémopathies malignes	2	33.3	1.8	0.5
Cerveau	1	16.7	0.9	0.3
Moelle épinière	1	16.7	0.9	0.3

POPULATION DE TIPAZA: Année 2008

Population totale : 591.010

Nombre des hommes : 297.869

Nombre des femmes : 293.141

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	285.98	273.93
5-9	257.70	247.55
10-14	293.14	282.73
15-19	326.50	316.44
20-24	333.65	324.07
25-29	298.80	292.12
30-34	248.16	246.39
35-39	210.63	210.33
40-44	173.99	173.10
45-49	138.55	138.80
50-54	115.02	113.01
55-59	8553	8516
60-64	6080	6405
65-69	5127	5497
70-74	4293	4734
+75	5604	6142
Total	297.869	293.141

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2008

Caractéristiques générales des cancers dans la wilaya de Tipaza

- 372 nouveaux cas de cancers enregistrés en 2008
- 138 nouveaux cas chez les hommes, soit 36.9% des tumeurs.
- 234 nouveaux cas soit 62.7% des tumeurs


Proportions de cas confirmés histologiquement :

	Pathologie de tumeur primitive	Pathologie de métastase
Hommes	84.1%	3.6%
femmes	89.3 %	0.9%

- **LES CANCERS CHEZ LES HOMMES :**
- **138 nouveaux cas soit 36.9% des tumeurs**
- **2 cas d'âge inconnu (1.4%)**
- **1 % de cas notifiés sur certificat de décès uniquement**

Répartition des cas par tranches d'âge :


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 0-4	•	5	•	3.6	• 3.6
• 5-9	•	1	•	0.7	• 1.3
• 10-14	•	3	•	2.2	• 6.5
• 15-19	•	3	•	2.2	• 8.7
• 20-24	•	5	•	3.6	• 12.3
• 25-29	•	2	•	1.4	• 13.8
• 30-34	•	4	•	2.9	• 16.7
• 35-39	•	6	•	4.3	• 21
• 40-44	•	8	•	5.8	• 26.8
• 45-49	•	7	•	5.1	• 31.9
• 50-54	•	13	•	9.4	• 41.3
• 55-59	•	11	•	8	• 49.3
• 60-64	•	20	•	14.5	• 63.8
• 65-69	•	14	•	10.1	• 73.9
• 70-74	•	14	•	10.1	• 84.1
• 75+	•	20	•	14.5	• 98.6
• Age inconnu	•	2	•	1.4	• 100
• Total	•	138	•	100	



**Cancers Hommes: incidences brutes par tranches d'âges
Tipaza 2008**

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les hommes Tipaza 2008 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	19	13.8	13.8	6.3	8.5
Vessie	16	11.6	25.4	5.4	7.7
Prostate	11	8	33.4	3.7	5
Estomac	11	8	41.4	3.7	5.2
Cerveau	9	6.5	47.9	3	3
Colon-rectum	8	5.8	53.7	2.7	3.8
Rhinopharynx	8	5.8	59.5	2.7	3.9
Système hématopoïétique	7	5.1	64.6	2.3	2.3
Larynx	6	4.3	68.9	2	3.6
lymphomes	6	4.3	73.2	2	2.1



**Cancers les plus fréquents chez l'homme
Tipaza 2008**

- Notons le taux d'incidence relativement faible du cancer du colon rectum dans cette wilaya

➤ **LES CANCERS CHEZ LES FEMMES**


- 234 nouveaux cas soit 62.7% des tumeurs
- 6 cas d'âge inconnu (2.6%)
- 1 % de cas notifiés sur certificat de décès uniquement

• Répartition des cas par tranches d'âge

Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 3	• 1.3	• 1.3
• 5-9	• 2	• 0.9	• 2.1
• 10-14	• 3	• 1.3	• 3.4
• 15-19	• 2	• 0.9	• 4.3
• 20-24	• 5	• 2.1	• 6.4
• 25-29	• 12	• 5.1	• 11.5
• 30-34	• 7	• 3	• 14.5
• 35-39	• 24	• 10.3	• 24.8
• 40-44	• 26	• 11.1	• 35.9
• 45-49	• 21	• 9	• 44.9
• 50-54	• 26	• 11.1	• 56
• 55-59	• 38	• 16.2	• 72.2
• 60-64	• 17	• 7.3	• 79.5
• 65-69	• 12	• 5.1	• 84.6
• 70-74	• 10	• 4.3	• 88.9
• 75+	• 20	• 8.5	• 97.4
• Age inconnu	• 6	• 2.6	• 100
• Total	• 234	• 100	


Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les femmes - Tipaza 2008 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence Cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	82	35	35	28	31.6
Col utérin	37	15.8	50.8	12.6	15.2
Système hématopoïétique	10	4.3	55.1	3.4	4.5
Thyroïde	9	3.8	58.9	3	3.2
ovaire	9	3.8	62.9	3	2.9
Colon rectum	8	3.4	66.1	2.7	3.8
Cerveau	8	3.4	69.5	2.7	3.3
Peau	8	3.4	72.9	2.7	3.3
Estomac	6	2.1	75	2	2.5
Rein	4	1.7	76.7	1.4	1.1
Foie-voies biliaires	4	1.7	78.4	1.4	1.5



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Tipaza 2008**

- Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer féminin dans cette wilaya
- Comme chez les hommes, l'incidence du cancer du colon rectum est notablement plus faible que dans les autres wilayas




**Cancers Femmes: incidences brutes par tranches d'âges
Tipaza 2008**

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge

Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 25-29	• 3	• 3.7	• 3.7
• 30-34	• 2	• 2.4	• 6.1
• 35-39	• 14	• 17.1	• 23.2
• 40-44	• 19	• 23.2	• 46.3
• 45-49	• 13	• 15.9	• 62.2
• 50-54	• 7	• 8.5	• 70.7
• 55-59	• 14	• 17.1	• 87.8
• 60-64	• 3	• 3.7	• 91.5
• 65-69	• 2	• 2.4	• 93.9
• 70-74	• 1	• 1.2	• 95.1
• 75+	• 3	• 3.7	• 98.8
• Age inconnu	• 1	• 1.2	• 100
• Total	• 82	• 100	

- L'incidence du cancer du sein est relativement élevée pour une première année d'enregistrement ;
- L'âge médian de ce cancer est plus précoce que dans les autres wilayas.



**Cancer du sein féminin
Tipaza 2008
Incidence brutes par tranches d'âges**

➤ **LES CANCERS DE L'ENFANT**

- 18 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez les moins de 15 ans, soit 4.8% des cancers enregistrés dans la wilaya
- 9 nouveaux cas chez les garçons (6.5% des cas masculins)
- 8 nouveaux cas chez les filles (3.4% des cas féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les garçons moins de 15 ans :

<i>Localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
Hémopathies malignes	5	55.6	5.9	1.8
Cerveau	2	22.2	2.4	0.8
méninges	1	11.1	1.2	0.4

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les filles moins de 15 ans :

<i>Localisation</i>	<i>effectifs</i>	<i>fréquence</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
Hémopathies malignes	5	62.5	6.2	1.8
rein	1	12.5	1.2	0.4

ALGER –HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Base de la langue	141	C01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.06	0.1
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	7	-	-	-	-	-	0.6	0.7	-	-	-	-	3.4	-	-	-	4.5	6.9	0.5	1.4
Gencive	143	C03	2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.1	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	4	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	3.8	-	6.9	0.3	0.2
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.1	0.1
Amygdales	146	C09	4	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	2.2	-	7.6	-	-	0.3	0.4
Oropharynx	146	C10	50	-	-	0.8	-	2.4	0.6	-	1.6	2.8	14.5	5.6	13.5	4.6	19.2	7.6	9.1	6.9	3.3	4
Rhinopharynx	147	C11	50	-	-	0.8	-	2.4	0.6	-	1.6	2.8	14.5	5.6	13.5	4.6	19.2	7.6	9.1	6.9	3.3	4
Sinus piriforme	148	C12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	0.06	0.1
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	10	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	15.2	4.5	3.5	0.7	1
Estomac	151	C16	97	4	-	-	-	0.6	0.6	2.6	3.9	0.9	6.7	5.6	21.9	9.1	31.9	37.9	54.3	76.3	6.3	7.8
Intestin grêle	152	C17	7	-	-	-	-	-	-	0.7	1.6	0.9	-	-	-	-	6.4	3.8	-	-	0.5	0.7
Côlon	153	C18	105	2	-	-	-	-	-	-	2.4	8.3	3.4	8.4	15.2	18.2	41.6	60.7	81.5	62.4	6.9	9.1
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	20	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	2.2	1.4	1.7	6.8	6.4	22.7	9.1	3.5	1.3	2
Rectum	154	C20	67	-	-	-	-	-	-	0.7	1.6	1.9	7.8	9.8	18.6	13.6	22.4	22.7	31.7	38.1	4.4	5.8
Canal anal	154	C21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	1.7	-	3.2	3.8	4.5	-	0.4	0.6
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	29	-	0.7	-	-	-	-	0.7	-	0.9	3.4	4.2	3.4	15.9	9.6	3.8	13.6	13.9	1.9	2.7
Vésicule biliaire	156	C23	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.7	6.8	6.4	11.4	13.6	24.3	1.3	1.9
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	2.3	3.2	-	4.5	6.9	0.4	0.5
Pancréas	157	C25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	4.2	10.1	15.9	22.4	26.5	9.1	31.2	2.8	4
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	4.5	-	0.2	0.4
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	3.5	0.1	0.2
Sinus de la face	160	C31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	3.2	3.8	4.5	6.9	0.5	0.6
Larynx	161	C32	41	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.1	5.6	8.5	9.1	25.6	30.3	9.1	27.8	2.7	4
Trachée	162	C33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	3.8	-	-	0.1	0.2
Bronches et poumon	162	C34	294	2	-	-	-	-	0.6	-	0.8	5.5	21.2	29.5	50.7	72.7	175.8	185.8	194.7	117.9	19.2	27.8
Thymus	164	C37	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.2	-	-	6.8	3.2	3.8	-	-	0.6	0.7
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	11	-	-	-	-	-	0.6	1.3	-	-	3.4	-	-	2.3	3.2	-	-	10.4	0.7	0.7

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age ind	-4	-9	-14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	-75et+	Incidence Brute	Incidence standard	
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	20	2	1.4	1.5	-	1.8	1.8	-	-	0.9	1.1	6.8	-	3.8	-	3.8	4.5	3.5	1.3	1.5	
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	16	-	-	0.8	1.3	1.2	1.8	0.7	0.8	0.9	1.1	-	3.4	2.3	3.2	-	-	-	1.04	1.1	
Hématopoïétique (sang)	169	C42	93	4	6.1	9.8	6	3	0.6	2.6	3.9	4.6	7.8	2.8	8.5	22.7	19.2	11.4	22.6	-	6.06	6.8	
Mélanome malin de la peau	172	C43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.06	0.1	
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	91	8	-	-	-	-	6.6	3.2	3.1	2.8	16.8	14	27	47.7	38.4	94.8	95.1	135.3	5.9	15.1	
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1	
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	4	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	9.1	-	0.3	0.4	
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1	
Sein masculin	174	C50	21	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.9	2.2	-	3.4	13.6	3.2	1.9	9.1	3.5	1.4	2	
Verge	184	C60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	0.06	0.1	
Prostate	179	C61	195	14	-	-	-	-	-	0.7	1.6	-	1.1	1.4	3.4	15.9	60.7	125.1	158.5	277.5	12.7	16.1	
Testicule	180	C62	13	2	-	-	-	0.6	2.3	0.7	-	1.9	2.2	1.4	-	-	-	-	-	-	0.8	0.7	
Organes génitaux masculins a.n.p.	182	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rein sans bassinnet	189	C64	33	-	-	0.8	0.5	-	-	-	0.8	0.9	1.1	5.6	6.8	4.6	9.6	15.2	9.1	17.3	2.2	2.6	
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urètre	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vessie	188	C67	223	24	-	-	-	-	-	-	2.4	3.7	3.4	18.2	23.7	5.0	95.9	106.1	176.6	149.1	14.6	18.3	
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Œil et annexes	190	C69	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.7	-	-	-	-	6.9	0.3	0.3	
Méninges	191	C70	12	-	0.7	-	-	-	0.6	-	1.6	0.9	-	-	3.4	2.3	6.4	-	4.5	6.9	0.8	1.1	
Cerveau	192	C71	91	2	7.5	3.8	2	0.6	0.6	2.6	2.4	10.2	2.2	4.2	8.5	38.6	25.6	30.3	-	24.3	5.9	7.2	
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	4	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	3.2	-	4.5	-	0.3	0.4	
Thyroïde	193	C73	33	-	-	-	-	-	0.6	0.7	2.4	1.9	4.5	9.8	6.8	4.6	12.8	7.6	9.1	3.5	2.2	2.7	
Surrénale	194	C74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	3.8	-	-	0.1	0.2	
-Aut. glandes endocrines	194	C75	2	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
Autres sièges et mal définis		C76	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	4.6	-	3.8	-	-	0.3	0.4	
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	73	-	1.4	1.5	2	4.2	4.1	5.2	3.9	5.5	4.5	7	5.1	11.4	9.6	19	13.6	10.4	4.8	5.2	
t. maligne de siège non précisé	199	C80	99	2	1.4	-	0.7	2.4	0.6	0.7	0.8	5.5	4.5	9.8	11.8	20.5	41.6	49.3	40.7	66	6.5	8.5	
Tous sites (basocellulaires exclus)			1894		66	19.9	19.8	13.2	19.8	23.8	27.1	39.6	68.3	143.3	165.1	289.9	440.4	738.7	948	1018.9	1172.4	133.1	172.4
Peau:Carcinomes basocellulaires			92		4	0.06	0.06	-	-	0.06	0.1	0.06	0.06	0.5	0.2	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	1.3	6	0.24
Tous sites basocellulaires inclus			1986		70	19.96	19.86	13.2	19.8	23.86	27.2	39.66	68.36	143.8	165.3	290.4	441.1	739.3	948.8	1019.7	1173.7	133.1	172.64

ALGER –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de la langue	141	C01	1	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.1
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4.1	6.3	0.3	0.3
Gencive	143	C03	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	4.6	3	-	-	-	0.3	0.4
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	0.07	0.1
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.1
Glande parotide	142	C07	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	4.6	3	-	-	-	0.3	0.4
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	3	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.2	0.3
Oropharynx	146	C10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.07	0.1
Rhinopharynx	147	C11	35	-	-	-	-	0.6	0.7	3.2	1.8	6.7	8.4	10.3	11.4	-	-	-	8.2	6.3	2.3	2.6
Sinus piriforme	148	C12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	2.3	-	-	-	3.2	0.2	0.3
Hypopharynx	148	C13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.07	0.1
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osoophage	150	C15	12	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	4.2	3.4	-	3	3.5	4.1	3.2	0.8	0.9	0.9
Estomac	151	C16	86	12	-	-	0.6	0.6	1.3	1.6	1.8	11.2	14	18.9	11.4	21.2	49.5	36.9	38	5.7	7.1	7.1
Intestin grêle	152	C17	12	1	-	-	-	-	-	0.8	1.8	-	4.2	-	-	3	3.5	-	9.5	0.8	0.8	0.8
Côlon	153	C18	99	-	-	-	-	-	-	3.2	3.7	10.1	11.2	22.4	20.5	39.4	28.3	20.5	82.3	6.6	8	8
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	4.6	6.1	3.5	-	3.2	0.5	0.7	0.7
Rectum	154	C20	70	3	-	-	-	-	2	1.6	7.4	10.1	5.6	8.6	9.1	27.3	17.7	28.7	34.8	4.6	5.3	5.3
Canal anal	154	C21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	6.1	3.5	-	-	0.3	0.4	0.4
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	29	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	1.1	4.2	8.6	4.6	9.1	10.6	16.4	19	1.9	2.5	2.5
Vésicule biliaire	156	C23	42	2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	4.2	12	13.7	12.1	35.4	8.2	19	2.8	3.8	3.8
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	3	3.5	4.1	6.3	0.5	0.5	0.5
Pancréas	157	C25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	3.4	6.8	9.1	17.7	4.1	9.5	1.3	2	2
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	4	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	-	-	-	2.3	-	-	-	3.2	0.3	0.3	0.3
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	4.1	3.2	0.2	0.3	0.3
Sinus de la face	160	C31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	3.2	0.1	0.2	0.2
Larynx	161	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	3	-	-	0.2	0.3	0.3
Trachée	162	C33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	3.2	0.1	0.2	0.2
Bronches et poumon	162	C34	53	1	-	-	-	-	0.7	0.8	2.8	2.2	4.2	5.2	11.4	18.2	28.3	41.1	31.6	3.5	4.4	4.4
Thymus	164	C37	10	1	-	-	0.6	1.2	0.7	1.6	-	-	-	1.7	4.6	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	6	-	-	-	-	0.6	0.7	0.8	-	1.1	-	-	-	-	-	8.2	-	0.4	0.4	0.4

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.																	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	12	-	-	0.8	0.7	-	1.8	-	-	2.2	-	3.4	-	2.3	3	3.5	-	-	0.8	0.9
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	12	-	-	-	0.7	-	0.6	0.7	-	0.9	2.2	-	1.7	4.6	3	7.1	4.1	6.3	0.8	1.2
Hématopoïétique (sang)	169	C42	48	1	0.7	2.4	4.1	0.6	1.2	1.3	1.6	0.9	2.2	5.6	5.2	4.6	12.1	14.1	12.3	22.2	3.2	3.6
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	57	2	-	-	-	1.2	1.2	0.7	0.8	5.5	6.7	5.6	8.6	41.1	33.3	38.9	36.9	107.6	3.8	8.7
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	7.1	-	3.2	0.3	0.4
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	3	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	3.5	-	-	0.2	0.3
Sein	174	C50	942	12	-	-	-	0.6	0.6	14	49	94.3	193.1	225.4	203	196.3	233.7	198	180.6	91.8	62.5	73.5
Vulve	184	C51	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	6.1	3.5	-	-	0.4	0.5
Vagin	179	C52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.1	0.2
Col utérus	180	C53	128	2	-	-	-	-	-	-	1.6	7.4	13.5	18.2	24.1	52.5	42.5	67.2	57.5	22.2	8.5	10.9
Corps de l'utérus	182	C54	38	1	-	-	-	-	-	1.3	0.8	0.9	1.1	7	10.3	13.7	12.1	21.2	16.4	3.2	2.5	3.2
Utérus et partie non précisée	179	C55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4.1	-	0.1	0.2
Ovaire	183	C56	99	1	-	-	-	-	1.2	1.3	2.4	6.5	11.2	14	24.1	27.4	48.6	21.2	36.9	22.2	6.6	8.1
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinnet	189	C64	28	1	1.4	1.6	-	0.6	-	0.7	-	-	-	-	2.8	6.9	-	9.1	3.5	28.7	1.9	2.5
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	29	1	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.1	-	5.2	2.3	12.1	10.6	16.4	31.6	1.9	2.3
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Œil et annexes	190	C69	5	1	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.2	0.3	0.4
Méninges	191	C70	26	-	-	-	-	0.6	-	0.8	4.6	2.2	5.6	3.4	9.1	3	7.1	16.4	-	-	1.7	1.9
Cerveau	192	C71	62	-	2.8	1.6	2.8	1.8	1.8	2	4	4.6	4.5	8.4	8.6	9.1	15.2	7.1	12.3	12.7	4.1	4.6
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	2	-	-	0.8	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
Thyroïde	193	C73	141	3	0.7	-	-	1.2	1.8	8	13.4	15.7	31.4	25.2	29.2	20.5	24.3	49.5	20.5	12.7	9.3	11.5
Surrénale	194	C74	2	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	0.1	0.2
-Aut. glandes endocrines	194	C75	4	-	-	-	0.7	1.2	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
Autres sièges et mal définis		C76	3	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	3.2	0.2	0.3
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	60	-	0.7	0.8	1.4	3.1	3.6	4	4	3.7	7.9	8.4	1.7	9.1	9.1	7.1	16.4	9.5	4	4.2
t. maligne de siège non précisé	199	C80	101	2	0.7	-	0.7	1.2	0.6	2	3.9	8.3	13.5	16.8	18.9	18.3	24.3	31.8	28.7	31.6	6.7	7.8
Tous sites (basocellulaires exclus)		2368		50	7.7	9.6	11.8	13.9	19.8	44.2	99.1	183.1	337.5	576	278	532	662.8	710.5	688.1	684.1	154.8	192.4
Peau:Carcinomes basocellulaires		55		1	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.3	0.06	0.06	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	1.3	3.65	0.17
Tous sites basocellulaires inclus		2423		51	7.7	9.6	11.8	13.9	19.9	44.2	99.2	183.4	337.6	576.1	278.2	532.5	663.1	710.8	688.4	685.4	154.8	192.57

Boumerdes –HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	-	-	13.1	0.5	0.6
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	1	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Amygdales	146	C09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	-	0.2	0.3
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	5.3	-	-	12.1	-	-	-	1	1
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.3	0.2	0.5
Estomac	151	C16	17	1	-	-	-	-	2.2	-	11.9	-	-	5.3	12.8	8.6	24.2	57.5	17.2	-	4.2	5.1
Intestin grêle	152	C17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	0.2	0.3
Côlon	153	C18	16	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	1.6	3.2	-	24.2	14.3	34.3	26.3	4	5.4
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	0.2	0.6
Rectum	154	C20	12	-	-	-	-	2.3	-	-	-	3.5	-	-	6.4	-	72.7	14.4	34.3	-	3	4.7
Canal anal	154	C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	4	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	6.4	8.6	-	28.7	-	13.1	1	1.1
Vésicule biliaire	156	C23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pancréas	157	C25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.4	8.6	-	28.7	-	13.1	1.5	2.1
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	-	-	-	0.2	0.3
Sinus de la face	160	C31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2	14.4	-	-	1	1.4
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et poumon	162	C34	30	-	-	-	-	-	-	2.5	-	3.5	4.2	-	12.8	51.7	48.5	86.2	86.6	65.7	7.4	3.9
Thymus	164	C37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	1	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	03
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hématopoïétique (sang)	169	C42	11	-	-	29	5	23	-	25	-	7	-	-	64	-	242	-	172	-	27	32
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	12	-	-	-	-	-	22	-	-	35	-	106	128	86	121	-	686	394	3	46
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	02	03
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sein masculin	175	C50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	185	C61	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	144	-	13.1	1	08
Testicule	186	C62	2	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	05	05
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinet	189	C64	5	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	64	86	242	-	-	-	12	19
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urètre	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	22	2	-	-	-	-	22	-	-	7	-	-	192	86	121	144	686	526	54	53
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	86	-	144	-	-	07	1
Cerveau	192	C71	14	-	52	-	25	-	22	-	3	35	85	-	256	172	-	-	-	-	35	39
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	64	86	-	-	-	-	1	12
Surrénale	194	C74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis		C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	11	-	26	-	25	23	22	74	-	-	-	53	128	-	-	-	172	-	27	27
t. maligne de siège non précisé	199	C80	9	1	26	-	-	-	44	-	-	-	-	106	64	-	-	-	-	-	22	26

Tous sites (basocellulaires exclus)	199	6	104	5.8	10	6.9	22	14.3	14.9	31.5	12.7	74.3	192	146.3	302.7	287.8	378.4	275.8	49.8	55.8
Peau: Carcinomes basocellulaires	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.2	-	0.74	0.034
Tous sites basocellulaires inclus	202	6	104	5.8	10	6.9	22	14.3	14.9	31.5	12.7	74.8	192	146.3	302.7	287.8	378.6	275.8	49.8	55.8

Boumerdes –FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	-	-	-	23	0.5
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	23	0.3
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	3.5	4.3	5.3	-	8.7	-	-	-	-	1.3	1.3
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	23	0.3
Estomac	151	C16	5	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	4.3	-	6.5	-	11.5	13.4	-	-	1.3	1.7
Intestin grêle	152	C17	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.5	-
Côlon	153	C18	8	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	4.3	5.3	6.5	8.7	11.5	-	15.6	12	2	24
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6.5	-	-	-	-	12	0.8	0.7
Rectum	154	C20	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	8.7	-	13.4	15.6	60	23	2.5
Canal anal	154	C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	13.4	-	-	0.5	0.7
Vésicule biliaire	156	C23	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	34.6	-	26.8	15.6	12	25	34
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	-	-	-	23	0.5

Pancréas	157	C25	5	-	-	-	-	-	23	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	31.1	12	1.3	1.3
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-S-i-nus de la face	160	C31	1	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Larynx	161	C32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bronches <i>et</i> poumon	162	C34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6	-	23	0.3	
Thymus	164	C37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0.2	
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	23	0.3	

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind	-4	-9	-14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	-75 et +	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	13.4	-	-	0.5	0.7
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	13.4	-	-	0.5	0.7
Hématopoïétique (sang)	169	C42	11	1	-	-	-	-	23	2.5	3	-	4.3	5.3	-	-	-	13.4	31.1	24	2.8	2.7
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.5	8.7	-	26.8	15.6	48	2.8	3
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	13.4	15.6	-	0.8	0.9
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0.2
Sein	174	C50	57	-	-	-	-	-	-	-	9	38.5	34.1	58.4	13	52	57.5	40.2	46.7	60	14.3	16.7
Vulve	184	C51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagin	179	C52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Col utérus	180	C53	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	6.5	34.6	23	40.2	15.6	24	3.5	4.8
Corps de l'utérus	182	C54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	12	0.5	0.5
Utérus et partie non précisée	179	C55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6	-	-	23	0.3
Ovaire	183	C56	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	8.7	23	13.4	31.1	-	1.8	2.4
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinet	189	C64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-	-	15.6	-	0.5	0.6
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	11.5	40.2	15.6	-	1.5	1.3
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Œil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	15.6	-	0.5	0.6
Cerveau	192	C71	11	1	2.7	-	-	4.6	-	2.5	3	-	-	15.9	6.5	-	11.5	-	-	-	2.8	2.9
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.3
Thyroïde	193	C73	11	-	-	-	-	-	23	-	-	3.5	4.3	15.9	13	-	-	40.2	-	-	2.8	3.6

Surrénale	194	C74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Aut. glandes endocrines	194	C75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis		C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	12	-	-	-	52	4.7	23	5	-	-	-	-	6.5	8.7	23	-	15.6	-	3	3.3
t. maligne de siège non précisé	199	C80	1	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0.2
Tous sites (basocellulaires exclus)	207			3	5.7	26	52	9.3	9.2	15.5	21	62.5	68.5	122	73.7	185.2	174.8	321.6	327.2	288	76.4	82.1
Peau: Carcinomes basocellulaires	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	0.5	-	1	2.01	0.08
Tous sites basocellulaires inclus	215			3	5.7	26	52	9.3	9.2	15.5	21	62.5	68.5	122.3	74	185.2	174.8	322.1	327.2	289	76.4	82.2

TIPAZA– HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	0.3	0.5
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	8	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	5.7	-	8.7	11.7	16.4	39	23.3	-	2.7	3.9
Sinus piriforme	148	C12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	-	-	-	0.3	0.7
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oesophage	150	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Estomac	151	C16	11	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	7.2	17.4	23.4	49.3	-	23.3	-	3.7	5.2
Intestin grêle	152	C17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côlon	153	C18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	11.7	16.4	-	49.6	-	1.7	2.5
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rectum	154	C20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	-	-	17.8	1	1.3
Canal anal	154	C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vésicule biliaire	156	C23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	17.8	0.7	1.1
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pancréas	157	C25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-	164	19.5	-	17.8	1.3	2.1
Organes digestifs, sièges aut. et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus de la face	160	C31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	49.3	19.5	23.3	-	2	1.8	
Trachée	162	C33	-																			
Bronches et poumon	162	C34	19	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5.7	-	17.4	23.4	49.3	39	46.6	107.1	3.4	8.5
Thymus	164	C37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Hématopoïétique (sang)	169	C42	7	-	7	3.9	6.8	-	3	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.3
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	-	-	-	-	-	53.5	1.7	1.2
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sein masculin	175	C50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.2	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	185	C61	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	58.5	70	53.5	3.7	5
Testicule	186	C62	2	-	-	-	-	-	3.3	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinnet	189	C64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	8.7	-	65.8	39	70	89.2	5.4	7.7
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil et annexes	190	C69	1	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Méninges	191	C70	1	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Cerveau	192	C71	9	1	7	-	-	-	6	-	4	-	-	7.2	-	11.7	-	19.5	-	-	3	3
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	5.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6
Surrénale	194	C74	1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3

Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres sièges et mal définis		C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	6	-	-	-	-	3.1	-	3.3	4	4.7	-	-	8.7	-	-	19.5	-	-	2	2.1
t. maligne de siège non précisé	199	C80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	17.4	23.4	-	19.5	23.3	17.8	2.7	3.6
Tous sites (basocellulaires exclus)		134	2	17.5	3.9	10.2	9.3	15	6.6	16.1	18.8	45.6	50.4	113.1	128.7	328.5	273	329.4	374.5	43.2	57.8	
Peau:Carcinomes basocellulaires		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	1.3	0.05	
Tous sites basocellulaires inclus		138	2	17.5	3.9	10.2	9.3	15	6.6	16.1	18.8	45.6	51.1	113.1	128.7	328.5	273	329.4	375.2	43.2	57.9	

TIPAZA–FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2008

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	-	0.3	0.4
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	0.3	0.3
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Estomac	151	C16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	11.7	31.2	-	21.1	-	-	1.7	2.5
Intestin grêle	152	C17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	21.1	-	-	0.7	0.8
Côlon	153	C18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	31.2	-	-	16.3	1.4	2
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	31.2	-	-	16.3	1	1.4
Rectum	154	C20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Canal anal	154	C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	15.6	-	-	-	1	1.1
Vésicule biliaire	156	C23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	48.8	1.4	1.5
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pancréas	157	C25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	16.3	0.7	0.7
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus de la face	160	C31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-	0.3	0.5
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et poumon	162	C34	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	-	15.6	-	21.1	-	1.4	1.9
Thymus	164	C37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	4	-	-	-	-	3.2	3.1	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	21.1	-	1.4	1.2
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	3	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	15.6	18.2	-	-	1	1.4
Hématopoïétique (sang)	169	C42	10	-	3.7	-	7.1	-	-	3.4	-	-	-	-	-	11.7	46.8	18.2	-	16.3	3.4	4.5
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	8	-	-	4	-	-	-	5.4	-	-	5.8	-	-	11.7	-	-	42.2	81.4	2.7	3.6
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sein	174	C50	82	1	-	-	-	-	-	10.3	8.1	66.6	109.8	93.7	61.9	164.4	46.8	36.4	21.1	48.8	28	31
Vulve	184	C51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagin	179	C52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Col utérus	180	C53	37	3	-	-	-	-	-	-	4.1	9.5	11.6	3.6	61.9	117.4	46.8	36.4	-	32.6	12.6	15.2
Corps de l'utérus	182	C54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	11.7	-	-	-	-	1	1.4
Utérus et partie non précisée	179	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaire	183	C56	9	-	-	-	-	-	3.1	3.4	4.1	9.5	11.6	7.2	-	11.7	-	-	-	-	3.1	2.9
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinet	189	C64	4	1	3.7	-	-	-	-	-	-	11.7	-	-	8.8	-	-	-	-	-	1.4	1.1
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	3	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	11.7	-	-	-	16.3	1	1.1
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Œil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	11.7	-	-	-	-	1	1.4
Cerveau	192	C71	8	-	-	-	-	3.2	-	-	4.1	4.8	-	-	-	23.5	-	54.6	-	-	2.7	3.1
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Thyroïde	193	C73	9	-	-	-	-	-	62	-	4.1	-	58	-	26.5	23.5	-	-	-	-	3.1	32
Surrénale	194	C74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	0.3	0.5
-Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis		C76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	0.7	0.6
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	6	-	3.7	4	-	-	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	2	1.9
t. maligne de siège non précisé	199	C80	4	-	-	-	3.5	-	3.1	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	21.1	-	1.4	1.1
Tous sites (basocellulaires exclus)	232			3	11.1	8	10.6	6.4	12.4	42.7	32	111.7	150.4	151.3	229.8	467	280.8	200.2	211	326	79.6	90.3
Peau: Carcinomes basocellulaires	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.02	0.04
Tous sites basocellulaires inclus	23				11.1	8	10.6	6.4	12.4		32	111.7	150.7	151.3	229.8	467	280.8	200.2	211.3	326.3	79.6	90.3

LES CANCERS DANS LA WILAYA D'ALGER EN 2009

Population d'Alger : année 2009

Population totale : 3.132.294

Nombre des hommes : 1.555.942

Nombre des femmes : 1.576.267

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	112.861	107.927
5-9	102.477	983.00
10-14	107.622	102.332
15-19	137.470	134.301
20-24	177.423	173.723
25-29	194.147	192.154
30-34	174.525	168.411
35-39	135.308	128.541
40-44	108.140	104.450
45-49	853.63	870.60
50-54	718.88	763.16
55-59	576.23	584.88
60-64	368.96	396.69
65-69	285.54	29.524
70-74	205.13	233.27
+75	254.58	314.18
Total	1.576.267	1.555.942

➤ Plus de 60 ans :

- 7.1% des hommes
- 8% des femmes
-

➤ Moins de 20 ans :

- 29.21% des hommes
- 28.46% des femmes

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2009

CARACTERISTIQUES GENERALES DES CANCERS DANS LA WILAYA D'ALGER

- 5299 nouveaux cas enregistrés dont :
- 2256 cas chez les hommes
- 3043 cas chez les femmes
- Sex ratio : 0.74

Proportions de cas confirmés histologiquement :


	Pathologie de tumeur primitive	Pathologie de métastase
hommes	77.2%	3.2%
femmes	79.6%	1.8%

➤ LES CANCERS CHEZ LES HOMMES:

- 2256 nouveaux cas : 42.6% des tumeurs.
- 51 cas d'âge inconnu, soit 2.3% des cancers masculins
- 51 cas sont notifiés sur certificat de décès uniquement, soit 7.8% des cas

• Répartition des cas par tranches d'âge :


Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 31	• 1.4	• 1.4
• 5-9	• 22	• 1	• 2.3
• 10-14	• 34	• 1.5	• 3.9
• 15-19	• 37	• 1.6	• 5.5
• 20-24	• 18	• 0.8	• 6.3
• 25-29	• 50	• 2.2	• 8.5
• 30-34	• 46	• 2	• 10.5
• 35-39	• 81	• 3.6	• 14.1
• 40-44	• 134	• 5.9	• 20.1
• 45-49	• 135	• 6	• 26.1
• 50-54	• 170	• 7.5	• 33.6
• 55-59	• 229	• 10.2	• 43.8
• 60-64	• 235	• 10.4	• 54.2
• 65-69	• 304	• 13.5	• 67.6
• 70-74	• 273	• 12.1	• 79.7
• 75+	• 409	• 18.1	• 97.9
• Age inconnu	• 48	• 2.1	• 100
• Total	• 2256	• 100	



**Cancers hommes : incidences brutes par tranches d'âges
Alger 2009**

Cancers les plus fréquents chez l'homme en 2009 : incidences brutes et standardisées

Localisation	effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standardisée
Poumon	328	14.5	14.5	20.81	0.7
Colon-rectum	322	14.27	28.77	20.36	26.6
Vessie	231	10.23	39	14.72	6.8
Prostate	223	9.88	48.88	14.15	19.9
Estomac	118	5.23	54.11	7.49	9.4
Système hématopoïétique	99	4.39	58.55	6.28	7.8
peau	95	4.21	62.71	6.03	6.8
lymphomes	83	3.68	66.39	5.27	6
cerveau	74	3.28	69.67	4.69	5.7
Rhinopharynx	69	3.06	72.73	4.38	4.7




Cancers les plus fréquents chez l'homme
Alger 2009

➤ LES CANCERS CHEZ LES FEMMES :

- 3043 nouveaux cas soit : 57.4% des tumeurs
- 42 cas d'âge inconnu, soit 1.4% des cas
- 4.1% des cas sont notifiés sur certificat de décès uniquement

Cancers chez les femmes : répartition par tranches d'âges -Alger 2009


Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 25	• 0.8	• 0.8
• 5-9	• 16	• 0.5	• 1.3
• 10-14	• 21	• 0.7	• 2
• 15-19	• 40	• 1.3	• 3.4
• 20-24	• 36	• 1.2	• 4.5
• 25-29	• 85	• 2.8	• 7.3
• 30-34	• 166	• 5.5	• 12.8
• 35-39	• 252	• 8.3	• 21.1
• 40-44	• 372	• 12.2	• 33.3
• 45-49	• 382	• 12.6	• 45.8
• 50-54	• 325	• 10.7	• 56.5
• 55-59	• 300	• 9.9	• 66.4
• 60-64	• 259	• 8.5	• 74.9
• 65-69	• 239	• 7.9	• 82.7
• 70-74	• 211	• 6.9	• 89.7
• 75+	• 272	• 8.9	• 98.6
• Age inconnu	• 42	• 1.4	• 100
• Total	• 3043	• 100	



**Cancers Femmes: incidences brutes par tranches d'âges
Alger 2009**

Cancers les plus fréquents chez les femmes : incidences brutes et standard - Alger 2009 :


localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	1311	43.1	43.1	84.26	88.1
Colon-rectum	216	7.1	50.2	13.88	14.7
Thyroïde	178	5.8	56	11.44	10.9
Col utérin	130	4.3	60.3	8.36	10.1
Estomac	105	3.5	63.8	6.75	7.9
Ovaire	98	3.2	67	6.30	6.8
Système hématopoïétique	82	2.7	69.7	5.27	6.3
lymphome	81	2.6	72.3	5.21	5
Vessie	57	1.9	74.2	3.66	4.4
Peau	55	1.8	76	3.53	3.8
Corps utérin	55	1.8	77.8	3.53	4



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Alger 2009**

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 10-14	•	1	•	0.1	• 0.1
• 15-19	•	2	•	0.2	• 0.2
• 20-24	•	4	•	0.3	• 0.5
• 25-29	•	20	•	1.5	• 2.1
• 30-34	•	76	•	5.8	• 7.9
• 35-39	•	158	•	12.1	• 19.9
• 40-44	•	214	•	16.3	• 36.2
• 45-49	•	248	•	18.9	• 55.1
• 50-54	•	180	•	13.7	• 68.9
• 55-59	•	130	•	9.9	• 78.8
• 60-64	•	100	•	7.6	• 86.4
• 65-69	•	63	•	4.8	• 91.2
• 70-74	•	59	•	4.5	• 95.7
• 75+	•	46	•	3.5	• 99.2
• Age inconnu	•	10	•	0.8	• 100
• Total	•	1311	•	100	



**Cancer du sein féminin
Alger 2009
Incidences brutes par tranches d'âges**

➤ **LES CANCERS DE L'ENFANT**

- 149 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez l'enfant en 2009, soit 2.8% des cancers
- 87 cas sont survenus chez les garçons (3.9% des cancers masculins)
- 62 cas chez les filles (2% des cancers féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de Alger chez les garçons moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence %	Incidence brute	Incidence standardisée
Hémopathies malignes	38	25.5	35.5	3.62
Cerveau	9	6	12	1.22

**Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de Alger
chez les filles moins de 15 ans :**

Localisation	effectifs	fréquence	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	15	10.1	14.6	1.5
Hémopathies malignes	20	13.4	19.6	2.1

POPULATION DE BOUMERDES: Année 2009

Population totale : 762.713

Nombre des hommes : 389.601

Nombre des femmes : 373.124

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	303.13	288.20
5-9	321.62	301.14
10-14	357.47	338.41
15-19	424.76	409.64
20-24	447.77	426.70
25-29	421.22	401.69
30-34	338.92	328.65
35-39	282.45	266.12
40-44	255.26	235.63
45-49	208.84	191.10
50-54	174.88	161.51
55-59	130.35	122.71
60-64	701.5	778.3
65-69	536.5	633.9
70-74	442.9	505.7
+75	612.6	679.4
Total	389.601	373.124

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2009 DANS LA WILAYA DE BOUMERDES :

- 565 nouveaux cas de cancers enregistrés, dont
- 256 nouveaux cas chez les hommes
- 309 nouveaux cas chez les femmes
- Sex ratio : 0.82

➤ **Proportions de cas confirmés histologiquement :**


	<i>Pathologie de tumeur primitive</i>	<i>Pathologie de métastase</i>
Hommes	73.3%	5.1%
femmes	82.8%	1.9%

➤ **LES CANCERS CHEZ LES HOMMES :**

- 256 nouveaux cas : 45.1% des tumeurs.
- 5 cas sont d'âge inconnu (2% des cas)
- 2.3% des cas sont notifiés sur certificat de décès uniquement

• Répartition par tranche d'âge :


Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 6	• 2.3	• 2.3
• 5-9	• 4	• 1.6	• 3.9
• 10-14	• 1	• 0.4	• 4.3
• 15-19	• 4	• 1.6	• 5.9
• 20-24	• 1	• 0.4	• 6.3
• 25-29	• 5	• 2	• 8.2
• 30-34	• 8	• 3.1	• 11.3
• 35-39	• 15	• 5.9	• 17.2
• 40-44	• 19	• 7.4	• 24.6
• 45-49	• 18	• 7	• 31.6
• 50-54	• 19	• 7.4	• 39.1
• 55-59	• 25	• 9.8	• 48.8
• 60-64	• 30	• 11.7	• 60.5
• 65-69	• 29	• 11.3	• 71.9
• 70-74	• 32	• 12.5	• 84.4
• 75+	• 35	• 13.7	• 98
• Age inconnu	• 5	• 2	• 100
• Total	• 256	• 100	



Cancers homme: incidences brutes par tranches d'âges
Boumer des 2009

Cancers les plus fréquents chez l'homme : incidences brutes et standard - Boumerdes, année 2009

localisation	Effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	35	13.7	13.7	9	15
Colon-rectum	33	12.9	26.6	8.5	11.7
peau	21	8.2	34.8	5.4	7.5
Vessie	19	7.4	42.2	4.9	6
Estomac	17	6.6	48.8	4.4	6.3
cerveau	17	6.6	55.4	4.4	5.1
Système hématopoïétique	13	5.1	60.5	3.3	5.2
lymphomes	12	4.7	65.2	3.1	4.6
Rhinopharynx	9	3.5	68.7	2.3	3.4
prostate	8	3.1	71.8	2.1	3.6




**Cancers les plus fréquents chez l'homme
Boumerdes 2009**

➤ **LES CANCERS CHEZ LES FEMMES:**

- 309 nouveaux cas : 54.8 % des tumeurs.
- 2 cas d'âge inconnu (0.6%)
- 2.6% des cas notifiés sur certificat de décès uniquement

➤ Répartition par tranches d'âges


Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 2	• 0.6	• 0.6
• 5-9	• 3	• 1	• 1.6
• 10-14	• 3	• 1	• 2.6
• 15-19	• 2	• 0.6	• 3.2
• 20-24	• 6	• 1.9	• 5.2
• 25-29	• 13	• 4.2	• 9.4
• 30-34	• 17	• 5.5	• 14.9
• 35-39	• 16	• 5.2	• 20.1
• 40-44	• 34	• 11	• 31.1
• 45-49	• 34	• 11	• 42.1
• 50-54	• 36	• 11.7	• 53.7
• 55-59	• 38	• 12.3	• 66
• 60-64	• 26	• 8.4	• 74.4
• 65-69	• 17	• 5.5	• 79.9
• 70-74	• 25	• 8.1	• 88
• 75+	• 35	• 11.3	• 99.4
• Age inconnu	• 2	• 0.6	• 100
• Total	• 309		



Cancers femme: incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes 2009

**Cancers les plus fréquents chez les femmes : incidences brutes et standardisées
Boumerdes 2009:**


localisation	Effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standard
Sein	96	31.1%	31.1%	25.7	29.7
Colon-rectum	32	10.4%	41.5%	8.6	10
Estomac	18	5.8%	47.3%	4.8	5.8
Thyroïde	18	5.8%	53.1%	4.8	5
Vésicule biliaire	18	5.8%	58.9%	4.8	6.6
Ovaire	14	4.5%	63.4%	3.8	3.8
Col utérin	12	3.9%	67.3%	3.2	3.7
Système hématopoïétique	11	3.6%	70.9%	2.9	3.6
cerveau	11	3.6%	74.5%	2.9	4.2
lymphomes	9	2.9%	77.4%	2.4	2.4



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Boumerdes 2009**

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 25-29	•	4	•	4.2	• 4.2
• 30-34	•	3	•	3.1	• 7.3
• 35-39	•	12	•	12.5	• 19.8
• 40-44	•	12	•	12.5	• 32.3
• 45-49	•	21	•	21.9	• 54.2
• 50-54	•	16	•	16.7	• 70.8
• 55-59	•	14	•	14.6	• 85.4
• 60-64	•	9	•	9.4	• 94.8
• 65-69	•	1	•	1	• 95.8
• 70-74	•	2	•	2.1	• 97.9
• 75+	•	1	•	1	• 99.0
• Age inconnu	•	1	•	1	
• Total	•	96	•	100	



**Cancer du sein féminin
Boumer des 2009
Incidences brutes par tranches d'âges**

➤ **LES CANCERS DE L'ENFANT**

- 19 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez l'enfant en 2009, soit 2.8% des cancers
- 11 cas sont survenus chez les garçons (4.3% des cancers masculins)
- 8 cas chez les filles (2.6% des cancers féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de boumerdes chez les garçons moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence %	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	4	21	12.3	1.3
Hémopathies malignes	2	10.6	6.4	0.7

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de boumerdes chez les filles moins de 15 ans :

Localisation	effectifs	fréquence	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	3	15.8	3.2	9.7
sarcomes	2	10.5	2.2	6.5
Hémopathies Malignes	1	5.3	1.1	3.2
ovaire	1	5.3	1.1	3.2

LES CANCERS DANS LA WILAYA DE TIPAZA EN 2009

POPULATION DE TIPAZA: Année 2009

Population totale : 597861

Nombre des hommes : 302.990

Nombre des femmes : 294.878

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	253.76	241.82
5-9	253.76	243.49
10-14	263.46	253.08
15-19	304.48	295.76
20-24	337.01	325.63
25-29	337.03	321.76
30-34	291.63	286.48
35-39	222.91	221.46
40-44	196.04	187.95
45-49	151.14	143.55
50-54	128.75	124.93
55-59	105.82	976.5
60-64	623.6	648.3
65-69	452.0	495.2
70-74	335.6	374.4
+75	453.6	534.4
Total	302.990	294.878

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRÉS EN 2009

Caractéristiques générales des cancers :

- 413 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés en 2009
- 180 cas chez les hommes (43.6%)
- 233 cas chez les femmes (56.4%)
- Le sex ratio est de 77.25%

➤ Proportions de cas confirmés histologiquement :


	Pathologie de tumeur primitive	Pathologie de métastase
Hommes	75.6%	1.1%
femmes	76.5%	3.4%

▪ LES CANCERS CHEZ LES HOMMES :

- 180 nouveaux cas soit 43.6 % des tumeurs.
- Sexe ratio : 0.8
- 5 cas sont d'âge inconnu (2.8%)
- 1.7% des cas sont notifiés sur certificat de décès uniquement

➤ Répartition par tranche d'âge :


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 0-4	•	5	•	2.8	• 3.3
• 5-9	•	3	•	1.7	• 5
• 10-14	•	3	•	1.7	• 6.7
• 15-19	•	6	•	3.3	• 10
• 20-24	•	2	•	1.1	• 11.1
• 25-29	•	1	•	0.6	• 11.7
• 30-34	•	6	•	3.3	• 15
• 35-39	•	4	•	2.2	• 17.2
• 40-44	•	7	•	3.9	• 21.1
• 45-49	•	12	•	6.7	• 27.8
• 50-54	•	16	•	8.9	• 36.7
• 55-59	•	21	•	11.7	• 48.3
• 60-64	•	22	•	12.2	• 60.6
• 65-69	•	15	•	8.3	• 68.9
• 70-74	•	21	•	11.7	• 80.6
• 75+	•	30	•	16.7	• 97.2
• Age inconnu	•	5	•	2.8	
• Total	•	180	•	100	



Cancers Hommes : incidences brutes par tranches d'âges
Tipaza 2009

Cancers les plus fréquents chez les hommes : incidences brutes et standard Tipaza 2009 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	25	13.9	13.9	8.6	12.6
Vessie	25	13.9	27.8	8.6	12.1
Colon-rectum	16	8.9	36.7	5.3	3.8
Estomac	15	8.33	45	5	6
Prostate	12	6.7	51.7	4	5.5
Peau	9	5	56.7	3	3.6
Cerveau	8	4.4	61.1	2.6	3.2
Rhinopharynx	8	4.4	65.5	2.6	3.3
Système hématopoïétique	6	3.3	68.8	2	3
lymphomes	5	2.8	71.6	1.7	2




Cancers les plus fréquents chez l'homme
Tipaza 2009

▪ LES CANCERS CHEZ LES FEMMES:

- 233 nouveaux cas soit 56.3% des tumeurs
- 0 cas d'âge inconnu
- 2.6% des cas notifiés sur certificat de décès uniquement
- Répartition par tranche d'âge :

Tranches d'âges	• s	Fréquence	•	%	% cumulés
• 0-4	•	2	•	0.9	• 1.3
• 5-9	•	3	•	1.3	• 2.6
• 10-14	•	1	•	0.4	• 3
• 15-19	•	6	•	2.6	• 5.6
• 20-24	•	8	•	3.4	• 9
• 25-29	•	11	•	4.7	• 13.7
• 30-34	•	20	•	8.6	• 22.3
• 35-39	•	25	•	10.7	• 33
• 40-44	•	34	•	14.6	• 47.6
• 45-49	•	28	•	12	• 59.7
• 50-54	•	23	•	9.9	• 69.5
• 55-59	•	11	•	4.7	• 74.2
• 60-64	•	19	•	8.2	• 82.4
• 65-69	•	17	•	7.3	• 89.7
• 70-74	•	24	•	10.3	• 100


•	Total	•	233	•	100
---	-------	---	------------	---	------------



**Cancers tous sites: incidences brutes par tranches d'âges
Femmes 2009**

Les incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les femmes en 2009 :


localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence Cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	87	37.3	37.3	29.5	33.8
Colon-rectum	27	11.6	48.9	9.2	11.5
Col utérin	21	9	57.9	7.1	8.3
peau	15	6.4	64.3	5.1	5.7
Vésicule biliaire	8	3.4	67.7	2.7	4
Rhinopharynx	7	3	70.7	2.4	2.6
Corps utérin	6	2.6	73.3	2	2.5
Estomac	5	2.1	75.4	1.7	2
Système hématopoïétique	5	2.1	77.5	1.7	2.3
Vessie	4	1.7	79.2	1.4	2.1
Cerveau	4	1.7	80.9	1.4	1.9
lymphomes	4	1.7	82.6	1.4	1.9



Cancers les plus fréquents chez la femme
Tipaza 2009

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 25-29	•	1	•	1.1	• 1.1
• 30-34	•	7	•	8	• 9.2
• 35-39	•	10	•	11.5	• 20.7
• 40-44	•	15	•	17.2	• 37.9
• 45-49	•	23	•	26.4	• 64.4
• 50-54	•	8	•	9.2	• 73.6
• 55-59	•	7	•	8	• 81.6
• 60-64	•	6	•	6.9	• 88.5
• 65-69	•	3	•	3.4	• 92
• 70-74	•	5	•	5.7	• 97.7
• 75+	•	2	•	2.3	• 100
• Total	•	87	•	100	



**Cancer du sein féminin
Tipaza2009
Incidences brutes par tranches d'âges**

➤ LES CANCERS DE L'ENFANT

- 17 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez les moins de 15 ans, soit 4.1% des cancers enregistrés dans la wilaya
- 11 nouveaux cas chez les garçons (6.1% des cas masculins)
- 6 nouveaux cas chez les filles (2.6% des cas féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les garçons moins de 15 ans :

<i>Localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
Cerveau	2	11.8	2.6	6.5
Hémopathies malignes	2	11.8	2.6	6.5
rein	2	11.8	2.6	6.5
os	1	5.9	1.3	3.2

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les filles moins de 15 ans :

<i>Localisation</i>	<i>effectifs</i>	<i>fréquence</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
cerveau	3	17.6	8.1	9.7
Hémopathies malignes	1	5.9	1.4	3.2

Alger –HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2009

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.04
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	9.7	3.9	0.44	0.6
Gencive	143	C03	2	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	-	0.12	0.2
Palais	145	C05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.12	0.2
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	9	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	12	-	-	27	-	9.7	3.9	0.57	0.6
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	4.9	-	0.38	0.5
Oropharynx	146	C10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	0.31	0.4
Rhinopharynx	147	C11	69	-	-	-	1.9	3.6	0.6	2.1	2.3	3.7	12.9	11.7	-	-	8.1	-	24.4	7.9	4.38	4.7
Sinus piriforme	148	C12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.06	0.1
Hypopharynx	148	C13	4	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.25	0.3
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Osoeophage	150	C15	14	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	1.5	-	23	-	-	2.7	-	4.9	11.8	0.89	1.07
Estomac	151	C16	118	1	-	-	-	1.5	0.6	-	23	3	8.3	14.1	125	-	37.9	-	97.5	94.3	7.49	9.36
Intestin grêle	152	C17	18	2	-	-	-	0.7	-	-	1.1	0.7	0.9	-	-	-	-	-	24.4	11.8	1.14	1.35
Côlon	153	C18	167	3	-	-	-	-	-	0.5	2.3	5.2	12	9.4	20.9	29.5	54.2	105.1	82.9	125.7	10.59	13.73
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	42	-	-	-	-	-	0.6	0.5	0.6	-	2.8	3.5	-	-	24.4	28	19.5	19.6	2.66	3.6
Rectum	154	C20	113	2	-	-	1.9	-	-	0.5	0.6	3.7	7.4	9.4	18.1	17.4	29.8	73.5	53.6	78.6	7.17	9.28
Canal anal	154	C21	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	5.4	-	4.9	15.7	0.63	0.85
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	22	1	0.9	-	0.9	-	-	0.5	-	-	-	12	-	-	8.1	-	9.7	-	1.39	1.91
Vésicule biliaire	156	C23	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	3.5	-	-	10.8	-	14.6	23.6	1.59	2.15
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	11	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	8.1	-	9.7	7.9	0.70	0.92
Pancréas	157	C25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	10.8	-	19.5	43.2	2.09	2.77
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	8	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	0.51	0.62
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	0.19	0.25
Sinus de la face	160	C31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12
Larynx	161	C32	46	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	15.6	8.1	4.9	3.9	23.6	2.92	4.13
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et poumon	162	C34	328	2	-	-	-	-	-	0.5	-	5.9	15.7	19.9	45.9	93.7	127.4	157.6	263.2	192.5	20.81	0.72
Thymus	164	C37	10	1	-	-	-	0.7	-	-	0.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.63	0.72
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8	2.3	-	-	2.7	-	9.7	7.9	0.95	1.07

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	14	-	0.9	-	-	3.6	1.7	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	4.9	-	0.89	0.97
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	15	1	-	-	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	-	-	2.3	-	-	5.4	-	-	11.8	0.95	1.09
Hématopoïétique (sang)	169	C42	99	3	8	9.8	9.3	3.6	1.1	3.6	1.7	2.2	6.5	3.5	-	-	13.6	-	3.9	23.6	6.28	7.8
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	95	1	-	-	-	1.5	1.1	2.6	3.4	4.4	3.7	11.7	13.9	-	16.3	-	14.6	98.2	6.03	6.83
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	2.7	-	4.9	7.9	0.63	0.76
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	9	-	-	-	-	0.7	-	-	0.6	0.7	0.9	1.2	-	-	8.1	-	-	3.9	0.57	0.66
Sein masculin	175	C50	23	1	-	-	-	-	-	-	0.6	-	2.8	2.3	-	-	13.6	-	14.6	-	1.46	1.88
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Prostate	185	C61	223	3	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	2.3	9.7	34.7	75.9	136.6	219.4	306.4	14.15	19.95
Testicule	186	C62	20	-	-	-	-	1.5	-	2.1	1.7	6.7	0.9	-	-	-	-	-	4.9	-	1.27	0.96
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	1	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.04
Rein sans bassinnet	189	C64	27	-	2.7	-	0.9	-	-	-	-	1.5	2.8	1.2	-	-	2.7	-	4.9	11.8	1.71	2.26
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urètre	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	232	14	-	-	-	0.7	-	-	1.1	3	0.9	7	18.1	36.4	89.4	154.1	165.7	-	14.72	20.4
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil et annexes	190	C69	2	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.12	0.12
Méninges	191	C70	15	1	0.9	-	-	-	-	0.5	-	1.5	1.8	1.2	-	-	-	-	-	11.8	0.95	1.02
Cerveau	192	C71	74	-	3.5	3.9	4.6	0.7	1.1	-	-	1.5	1.2	11.7	-	-	8.1	31.5	19.5	27.5	4.69	5.72
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	0.19	0.25
Thyroïde	193	C73	37	4	-	1	-	0.7	-	0.5	1.7	1.5	4.6	9.4	-	-	2.7	-	-	3.9	2.35	3.04
Surrénale	194	C74	3	-	0.9	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.26
Aut. glandes endocrines	194	C75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	3.9	0.19	0.29
Autres sièges et mal définis		C76	4	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	3.9	0.25	0.33
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	83	1	1.8	2.9	3.7	2.2	1.1	4.1	-	2.2	1.2	4.7	-	19.1	8.1	-	3.9	23.6	5.27	5.95
t. maligne de siège non précisé	199	C80	168	3	3.5	2.9	5.6	3.6	0.6	1.5	2.3	4.4	8.3	15.2	16.7	22.6	35.2	84.1	87.7	121.8	10.66	13.6
Tous sites (basocellulaires exclus)			2256	46	24.9	20.5	30.6	26.7	10.3	19.3	25.3	59	122.6	158	155.8	269	636.5	819.5	1325.8	1363.2	142.9	156.6
Peau: Carcinomes basocellulaires			94	2	-	-	-	0.73	-	0.52	1.15	-	4.62	9.37	2.78	15.62	5.42	17.51	63.37	172.83	6	7.34
Tous sites basocellulaires inclus			2350	48	24.9	20.5	30.6	27.43	10.3	19.82	26.45	59	127.22	167.4	148.88	284.62	641.92	837.01	1389.2	1229.63	148.9	163.94

Alger FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2009

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	32	0.13	0.2
Base de la langue	141	C01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	2	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	0.13	0.2
Gencive	143	C03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0.06	0.1
Glande parotide	142	C07	8	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.8	1	-	1.3	34	-	-	4.3	-	0.51	0.7
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	0.06	0.1
Amygdales	146	C09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	64	0.19	0.2
Oropharynx	146	C10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	0.06	0.1
-Rhinopharynx	147	C11	37	-	-	-	-	1.5	1.7	0.5	3.6	23	1.9	6.9	6.6	6.8	-	6.8	-	9.5	2.38	2
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	32	0.13	0.2
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0.06	0.1
Osoophage	150	C15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.1	-	34	25	6.8	4.3	64	0.64	0.9
Estomac	151	C16	105	2	-	-	-	-	-	2.1	1.2	3.1	8.6	10.3	6.6	25.6	30.3	30.5	72.9	54.1	6.75	7.9
Intestin grêle	152	C17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	1.7	7.6	34	8.6	9.5	0.77	1
Côlon	153	C18	131	3	-	-	1	-	-	0.5	3.6	23	19.1	8	17	32.5	30.3	40.6	60	63.5	8.42	9.3
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	37	-	-	-	-	0.7	-	0.5	1.2	0.8	2.9	34	2.6	10.3	12.6	10.2	8.6	25.5	2.38	2.7
Rectum	154	C20	93	-	-	-	-	-	0.6	1	1.2	3.9	124	5.7	13.1	13.7	30.3	47.4	30	44.6	6	2.7
Canal anal	154	C21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1.3	-	-	-	4.3	32	0.26	0.4
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.1	2.6	1.7	2.5	13.5	4.3	12.7	0.96	1.2
Vésicule biliaire	156	C23	53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5.2	154	17.6	27.1	42.9	38.2	3.41	4.4
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1.3	34	2.5	-	8.6	9.5	0.64	0.9
Pancréas	157	C25	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.9	5.1	5	16.9	4.3	19.1	1.54	1.9
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.3	-	5	-	-	64	0.39	0.5
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	1.3	-	-	34	-	-	0.26	0.3
-S-i-nus de la face	160	C31	3	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	2.5	34	-	-	0.19	0.2
Larynx	161	C32	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.1	1.3	-	-	34	17.1	-	0.58	0.7
Trachée	162	C33	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches <i>et</i> poumon	162	C34	54	-	-	-	-	0.7	0.6	-	1.2	1.6	1	6.9	6.6	154	15.1	33.9	214	19.1	347	3.1
Thymus	164	C37	10	1	-	-	-	-	-	1	-	1.6	1	-	-	-	5	34	4.3	-	0.64	0.7
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	7	1	-	-	-	-	0.6	0.5	0.6	0.8	-	1.1	-	1.7	-	-	-	-	0.45	0.2

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Ages ind	-4	-9	-14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	-75et +	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0.06	0.1
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	11	1	-	1	2	1.5	0.6	-	-	-	-	-	1.3	3.4	2.5	-	-	-	0.71	0.8
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	8	-	-	-	-	1.5	-	-	1.2	-	-	-	-	-	5	-	8.6	-	0.51	0.6
Hématopoïétique (sang)	169	C42	82	-	5.6	4.1	3.9	2.2	1.7	1.6	1.2	3.1	5.7	3.4	11.8	3.4	35.3	10.2	21.4	35	5.27	6.3
Mélanome malin de la peau	172	C43	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	54	1	-	-	-	0.7	1.2	2.1	0.6	0.8	6.7	2.3	2.6	13.7	7.6	20.3	17.1	38.2	3.53	3.8
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	13	-	-	-	1	-	-	-	0.6	0.8	1	2.3	2.6	-	5	3.4	4.3	3.2	0.84	0.9
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	7	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	1	-	-	1.7	2.5	-	-	-	0.45	0.5
Sein	174	C50	1311	10	-	-	1	1.5	2.3	10.4	45.1	122.9	204.9	284.9	235.9	222.3	252.1	213	252.9	146.4	84.26	88.1
Vulve	184	C51	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	3.4	-	-	-	9.5	0.39	0.4
Vagin	179	C52	9	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1	1.1	1.3	1.7	2.5	6.8	-	3.2	0.58	0.8
Col utérus	180	C53	130	1	-	-	-	-	-	0.5	1.2	2.3	14.4	14.9	15.7	22.2	32.8	88.1	55.7	60.5	8.36	10.1
Corps de l'utérus	182	C54	55	3	-	-	-	-	-	-	1.2	2.3	3.8	2.3	7.9	17.1	25.2	6.8	34.3	12.7	0.19	4
Utérus et partie non précisée	179	C55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.4	-	-	0.13	0.2
Ovaire	183	C56	98	1	-	-	-	0.7	1.7	2.6	3	7.8	12.4	17.2	6.6	13.7	27.7	33.9	30	9.5	6.30	6.8
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	0.06	0.1
Placenta	181	C58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	0.13	0.2
Rein sans bassinet	189	C64	30	1	2.8	1	1	-	-	-	1.8	3.1	2.9	4.6	1.3	-	7.6	3.4	12.9	6.4	1.93	2.2
Bassinets	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.5	10.5	5.1	17.6	37.3	42.9	31.8	3.66	4.4
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Œil et annexes	190	C69	5	-	1.9	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	1.7	-	-	4.3	-	0.32	0.4
Méninges	191	C70	21	-	-	-	-	-	-	1	1.2	0.8	1	4.6	6.6	3.4	5	-	4.3	3.2	1.35	1.5
Cerveau	192	C71	67	2	5.6	3.1	5.9	3	0.6	1.6	2.4	4.7	5.7	1.1	6.6	5.1	2.5	13.5	21.4	22.3	4.31	4.6
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	178	5	-	-	-	0.7	2.3	7.3	15.4	18.7	17.2	18.4	18.3	22.2	27.7	57.6	30	25.5	11.44	10.9
Surrénale	194	C74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.06	0.1
-Aut. glandes endocrines	194	C75	6	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.8	1	-	-	1.7	2.5	-	4.3	-	0.39	0.4
Autres sièges et mal définis	-	C76	3	-	0.9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.3
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	81	-	0.9	4.1	1	8.9	5.2	8.3	4.8	3.1	2.9	9.2	1.3	1.7	-	13.5	4.3	25.5	5.21	5
t. maligne de siège non précisé	199	C80	155	3	2.8	1	3.9	4.5	1.2	2.1	4.2	5.4	11.5	14.9	19.7	25.6	22.7	44	60	85.9	9.96	11.1
Tous sites (basocellulaires exclus)		3043		42	20.5	15.3	20.7	29.5	20.9	44.1	98.9	196.2	356.7	438	436.3	512.6	652.6	617.6	904.6	865.7	192.23	209.5
Peau:Carcinomes basocellulaires		73	-	1	-	-	-	-	-	-	0.59	0.78	1.91	2.30	10.26	-	20.17	16.94	38.58	85.94	4.69	4.59
Tous sites basocellulaires inclus		3116		43	20.5	15.3	20.7	29.5	20.9	44.1	99.49	196.9	358.6	668	446.5	512.6	672.77	634.54	943.18	951.64	196.92	214.09

BOUMERDES– HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2009

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	18.6	-	-	0.5	0.8
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	7.8	4.8	-	-	28.5	18.6	22.6	16.3	2.3	3.4
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oesophage	150	C15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	18.6	22.6	-	0.8	1.3
Estomac	151	C16	17	-	-	-	-	-	-	4.7	-	3.5	3.9	19.2	5.7	7.7	5.7	18.6	22.6	16.3	4.4	6.3
Intestin grêle	152	C17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.9	4.8	-	-	14.3	-	-	-	1.03	1.3
Côlon	153	C18	15	-	-	-	-	-	-	2.4	3	7.1	3.9	4.8	5.7	15.3	14.3	18.6	54.2	32.6	3.9	5
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	18.6	-	16.3	0.8	1.5
Rectum	154	C20	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	11.8	4.8	-	30.7	-	37.3	67.7	16.3	3.9	5.2
Canal anal	154	C21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	0.3	0.3
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	0.5	0.3
Vésicule biliaire	156	C23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.7	14.3	18.6	22.6	16.3	1.5	2.6
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pancréas	157	C25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.8	-	-	14.3	-	22.6	-	1.03	1.6
Organes digestifs, sièges aut. et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus de la face	160	C31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	6	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	-	22.6	-	1.5	2.5
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches et poumon	162	C34	35	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.8	9.6	22.9	23	99.8	149.1	112.9	32.6	9	15
Thymus	164	C37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.6	-	0.3	0.5
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	14.3	-	-	-	0.5	0.9

-SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Ages ind	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. -intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	7.7	-	-	-	-	0.5	0.5
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	4	1	-	-	-	24	-	-	-	3.5	-	-	-	7.7	-	-	-	-	1.03	0.7
Hématopoïétique (sang)	169	C42	13	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	15.3	14.3	-	112.9	32.6	3.3	5.2
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	20	-	-	-	-	-	-	-	3	7.1	3.9	9.6	11.4	-	14.3	55.9	45.2	114.3	5.1	7.5
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	-	-	0.3	0.6
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sein masculin	175	C50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	-	-	-	0.5	1.1
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	185	C61	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	18.6	67.7	49	2.1	3.6
Testicule	186	C62	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinnet	189	C64	4	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6	1.03	1.5
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urètre	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	19	3	-	-	-	-	-	24	5.9	-	-	-	-	15.3	14.3	55.9	45.2	81.6	4.9	6
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerveau	192	C71	17	-	3.3	6.2	2.8	24	2.2	-	3	3.5	3.9	4.8	22.9	7.7	14.3	18.6	-	-	4.4	5.1
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	7.8	4.8	-	-	-	18.6	-	-	1.3	1.6
Surrénale	194	C74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	0.3	0.3
Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis		C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	12	-	-	3.1	-	-	-	24	5.9	3.5	3.9	-	5.7	15.3	-	18.6	22.6	16.3	3.1	4.6
t. maligne de siège non précisé	199	C80	21	-	6.6	-	-	4.7	-	-	-	3.5	3.9	14.4	5.7	23	28.5	18.6	45.2	49	5.4	7.3
Tous sites (basocellulaires exclus)	256			5	19.8	12.4	2.8	9.5	2.2	11.9	23.8	52.8	74.2	86.4	97.1	191.8	428.1	540	731.8	571	65.82	94.3
Peau: Carcinomes basocellulaires	4			-	-	-	-	-	-	23.7	-	-	-	-	-	-	14.26	-	22.58	16.32	0.26	1.6
Tous sites basocellulaires inclus	260			5	19.8	12.4	2.8	9.5	2.2	14.2	23.8	52.8	74.2	86.4	97.1	191.8	442.36	540	754.38	587.32	66.08	95.9

BOUMERDES-FEMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2009

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-	-	0.27	0.47
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.4	0.54	0.59
Gencive	143	C03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	0.27	0.32
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palais	145	C05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	0.27	0.32
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glande parotide	142	C07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhinopharynx	147	C11	3	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	4.2	-	6.2	-	-	-	-	-	0.80	0.76
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osoeophage	150	C15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	-	14.7	0.54	0.8
Estomac	151	C16	18	-	-	-	-	-	-	-	6.1	3.8	-	5.2	12.4	32.6	-	15.8	79.1	44.2	4.82	5.76
Intestin grêle	152	C17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	8.1	-	15.8	-	-	0.80	1.04
Côlon	153	C18	18	-	-	-	-	-	4.7	2.5	9.1	-	8.5	5.2	24.8	16.3	-	15.8	39.5	-	4.82	5.1
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	12.8	15.8	-	-	0.80	1.23
Rectum	154	C20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	10.5	12.4	-	-	15.8	39.5	44.2	2.95	3.64
Canal anal	154	C21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	5.2	-	-	25.7	-	-	-	1.07	1.57
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	19.8	-	0.54	0.91
Vésicule biliaire	156	C23	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	15.7	6.2	24.4	12.8	63.1	39.5	44.2	4.82	6.55
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pancréas	157	C25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	12.8	-	-	-	0.54	0.83
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus de la face	160	C31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches <i>et</i> poumon	162	C34	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6.2	-	-	15.8	-	14.7	1.07	1.25
Thymus	164	C37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	8.1	-	-	-	-	0.54	0.57
Hématopoïétique (sang)	169	C42	11	-	-	3.3	-	-	-	5	-	-	-	-	62	-	128	-	59.3	44.2	2.95	3.62
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	38.5	15.8	-	58.9	2.95	3.97
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	2	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	0.54	0.84
Sein	174	C50	96	1	-	-	-	-	-	10	9.1	45.1	50.9	109.9	99.1	114.1	115.6	15.8	39.5	14.7	25.73	29.68
Vulve	184	C51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	0.27	0.29
Vagin	179	C52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	0.54	0.62
Col utérus	180	C53	12	-	-	-	-	-	-	-	3	3.8	8.5	15.7	6.2	-	12.8	15.8	-	29.4	3.22	3.74
Corps de l'utérus	182	C54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	25.8	-	59.3	14.7	1.88	2.83
Utérus et partie non précisée	179	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaire	183	C56	14	-	-	3.3	-	2.4	2.3	5	-	-	21.2	-	6.2	16.3	-	-	19.8	-	3.75	3.76
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinet	189	C64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	14.7	0.80	1.08
Bassinets	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	8.1	-	-	19.8	14.7	1.07	1.19
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œil et annexes	190	C69	2	1	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.49
Méninges	191	C70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	6.2	-	-	-	-	-	0.54	0.56
Cerveau	192	C71	13	-	6.9	-	3	2.4	2.3	-	-	-	-	-	6.2	32.6	-	15.8	-	29.4	3.48	4.17
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	18	-	-	-	-	-	-	-	15.2	3.8	1.7	-	12.4	16.3	12.8	15.8	-	29.4	4.82	5
Surrénale	194	C74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis		C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	9	-	-	-	-	-	4.7	5	3	-	4.2	-	-	-	-	15.8	19.8	14.7	2.41	2.37
t. maligne de siège non précisé	199	C80	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	19.8	44.2	1.88	2.42
Tous sites (basocellulaires exclus)		310		2	6.9	9.9	3.9	4.8	1.4	32.5	51.5	59.1	143.9	167.4	223.1	309.3	333.6	268.5	494.2	515.1	82.84	98.34
Peau:Carcinomes basocellulaires		7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.24	-	-	16.30	-	31.55	39.55	-	1.88	2.7

Tous sites basocellulaires inclus				317	2	6.9	9.9	3.9	4.8	14	32.5	51.5	59.1	148.2	167.4	223.1	325.06	333.6	300.05	533.75	515.1	84.72	101.04
TIPAZA HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2009																							
SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard	
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Base de la langue	141	C01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1	-	-	0.33	0.66	
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plancher de la bouche	144	C04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	0.33	0.64	
Palais	145	C05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Glande parotide	142	C07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1	-	-	0.33	0.66	
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amygdales	146	C09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rhinopharynx	147	C11	6	-	-	-	-	3.3	-	-	3.4	-	-	19.8	7.8	-	16	-	29.8	-	1.98	3.32	
Sinus piriforme	148	C12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osoophage	150	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	0.33	0.38	
Estomac	151	C16	8	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	10.2	13.2	-	28.4	-	-	29.8	44.1	2.64	6.03	
Intestin grêle	152	C17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	0.33	0.40	
Côlon	153	C18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	6.6	-	9.5	16	-	29.8	-	2.31	3.50	
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	0.33	0.38	
Rectum	154	C20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	16	22.1	29.8	18.4	1.98	3.42	
Canal anal	154	C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vésicule biliaire	156	C23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	22.1	-	36.8	0.99	1.80	
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	16	-	-	-	0.66	1.04	
Pancréas	157	C25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	29.8	36.8	0.99	1.72	
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sinus de la face	160	C31	1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.20	
Larynx	161	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	9.5	16	-	-	-	0.99	2.19	
Trachée	162	C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bronches et poumon	162	C34	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.1	18.9	48.1	132.7	89.4	128.8	1.98	12.58	
Thymus	164	C37	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.24	
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	-4	-9	-14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75et +	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	3	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	0.99	0.72
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	0.66	1.12
Hématopoïétique (sang)	169	C42	4	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	7.8	-	48.1	-	-	-	1.32	2.99
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	59.6	55.2	1.65	3.64
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8	-	0.33	0.60
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	2	-	4	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.78
Sein masculin	175	C50	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	16	-	-	-	0.99	1.77
Verge	187	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	185	C61	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.9	-	44.2	59.6	73.6	1.65	5.53
Testicule	186	C62	2	-	-	-	-	3.3	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.50
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinnet	189	C64	3	-	8	-	-	-	-	-	-	4.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	0.99	1.54
Bassinnet	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urètre	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	13.2	-	18.9	96.2	-	89.4	147.2	2.64	12.14
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	1	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.39
Cerveau	192	C71	7	-	4	3.9	-	-	-	-	6.9	-	5.1	-	-	9.5	-	22.1	29.8	-	2.31	3.23
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9.5	-	-	-	-	0.66	0.62
Surrénale	194	C74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. glandes endocrines	194	C75	2	-	-	3.9	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.66
Autres sièges et mal définis	-	C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	4	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8	18.4	1.32	1.89
t. maligne de siège non précisé	199	C80	5	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	5.1	6.6	-	-	16	-	29.8	-	1.65	2.84
Tous sites (basocellulaires exclus)	180			5	20	11.7	11.5	16.5	3	6	20.5	18	35.7	79.2	73.3	179.6	336.4	168.4	566.2	519.3	35.64	80.12
Peau: Carcinomes basocellulaires	8			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.62	-	-	32.07	-	29.80	66.14	2.64	3.6
Tous sites basocellulaires inclus	188			6	20	11.7	11.5	16.5	3	6	20.5	18	35.7	85.82	73.3	179.6	368.47	168.4	596	585.5	38.28	81.92

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.32
Hématopoïétique (sang)	169	C42	5	-	4.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	30.8	-	-	18.7	1.70	2.34
Mélanome malin de la peau	172	C43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	15	-	-	-	-	-	-	3.1	-	4.5	-	13.9	-	10.2	-	20.2	53.4	112.3	5.09	5.69
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7	-	0.33	0.53
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sein	174	C50	87	-	-	-	-	-	-	3.1	24.4	45.2	79.8	160.2	64	71.7	92.5	60.6	133.5	37.4	29.50	33.83
Vulve	184	C51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	-	-	-	-	0.33	0.41
Vagin	179	C52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Col utérus	180	C53	21	-	-	-	-	-	-	3.1	3.5	9	-	7	24	51.2	-	20.2	80.1	56.1	7.12	8.32
Corps de l'utérus	182	C54	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	10.2	-	-	26.7	18.7	2.03	2.51
Utérus et partie non précisée	179	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaire	183	C56	2	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68	0.48
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta	181	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rein sans bassinet	189	C64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	0.33	0.40
Bassinets	189	C65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uretere	189	C66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	-	20.2	53.4	-	1.36	2.09
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Œil et annexes	190	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges	191	C70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	-	-	-	-	0.33	0.41
Cerveau	192	C71	5	-	-	-	8.2	4	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	18.7	1.70	1.87
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyroïde	193	C73	9	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.5	13.5	5.3	7	-	10.2	-	-	-	-	3.05	2.67
Surrénale	194	C74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. glandes endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres sièges et mal définis	-	C76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	4	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	10.2	-	40.4	-	-	1.36	1.86
t. maligne de siège non précisé	199	C80	13	-	4.1	4.1	-	-	-	6.2	-	-	16	-	16	10.2	15.4	20.2	-	18.7	4.41	5.17
Tous sites (basocellulaires exclus)		233		-	8.2	12.3	4	-	18.5	24.8	38.4	90.2	127.6	223	224	235.1	169.5	363.4	453.9	448.9	79.24	92.68
Peau:Carcinomes basocellulaires		10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.97	8	-	15.42	60.58	53.42	37.43	3.39	5
Tous sites basocellulaires inclus		243		-	8.2	12.3	4	-	18.5	24.8	38.4	90.2	127.6	229.97	232	235.1	184.92	423.98	507.32	486.33	82.63	97.68

LES CANCERS DANS LA WILAYA D'ALGER EN 2010

Population d'Alger : année 2010

Population totale : 3.187.581

Nombre des hommes : 1.606.305 soit 50.4% de la population

Nombre des femmes : 1.581.233 soit 49.6% de la population

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	1.135.85	1.086.46
5-9	1.024.77	98.982
10-14	1.048.97	1.002.85
15-19	1.343.98	1.311.78
20-24	1.764.99	1.718.45
25-29	1.984.13	1.965.47
30-34	1.825.63	1.741.01
35-39	1.395.36	1.316.02
40-44	1.121.45	1.083.91
45-49	89.380	91.206
50-54	75.059	79.683
55-59	59.718	60.655
60-64	41.237	41.813
65-69	28.554	29.524
70-74	21.489	23.327
+75	26.354	33.449
Total	1.606.305	1.581.233

➤ Plus de 60 ans :

- 7.3 % des hommes
- 6.4 % des femmes

➤ Moins de 20 ans :

- 28.3% des hommes
- 27.8% des femmes

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES DANS LA WILAYA D'ALGER EN 2010

Caractéristiques générales des cancers dans la wilaya d'Alger

- 4769 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés :
 - 2115 cas chez l'homme : 44.3 % des tumeurs malignes enregistrées.
 - 2654 cas chez la femme : 55.7% des cas.
 - Incidences annuelles brutes : 125 nouveaux cas pour 100.000 hommes et 164.1 nouveaux cas pour 100.000 femmes.
 - Le Sexe ratio est de 0.8
-
- Proportions de cas confirmés histologiquement :

	<i>Pathologie de tumeur primitive</i>	<i>Pathologie de métastase</i>
Hommes	83.8%	2.4%
Femmes	84.3%	1.5%


➤ LES CANCERS CHEZ L'HOMME

- 2008 nouveaux cas de cancers masculins, basocellulaires exclus ;
- 38 cas de cancers sont d'âge inconnu (1.8%).
- 5.1 % des cancers masculins ont été notifiés par certificats de décès.
- **Incidence annuelles brute : 125 nouveaux cas pour 100.000 hommes**

Répartition des cas par tranches d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 0-4	•	31	•	1.5	• 1.5
• 5-9	•	32	•	1.5	• 3
• 10-14	•	20	•	0.9	• 3.9
• 15-19	•	18	•	0.9	• 4.8
• 20-24	•	36	•	1.7	• 6.5
• 25-29	•	39	•	1.8	• 8.3
• 30-34	•	60	•	2.8	• 11.2
• 35-39	•	75	•	3.5	• 14.7
• 40-44	•	95	•	4.5	• 19.2
• 45-49	•	142	•	6.7	• 25.9
• 50-54	•	177	•	8.4	• 34.3
• 55-59	•	189	•	8.9	• 43.3
• 60-64	•	233	•	11	• 45.2
• 65-69	•	262	•	12.4	• 66.6
• 70-74	•	240	•	11.3	• 78
• 75+	•	428	•	20.2	• 98.2
• Age inconnu	•	38	•	1.8	• 100
• Total	•	2115			


- L'âge médian de survenue des cancers, tous sites confondus, se situe entre 60 à 65 ans.


Cancers Hommes: répartition de l'incidence par tranches d'âges - Alger 2010

Incidences brutes et incidences standardisées les plus élevées - hommes 2010 :

Localisation	effectifs	Fréquence Relative %	Incidence brute	Incidence standardisée
• Poumon	289	14.4	18	25.9
• Colon-rectum	252	12.5	15.7	19.92
• Prostate	226	13.3	14.1	20.6
• Système	167	8.3	10.4	11.92
hématopoïétique				
• vessie	165	8.2	10.3	13.56
• Estomac	94	4.7	5.9	7.95
• Peau	93	4.6	5.8	7.79
• Cerveau	84	4.2	5.2	6.24
• Rhino pharynx	81	4	5	5.55
• Larynx	55	2.7	3.4	5.02

- Malgré une diminution de l'incidence par rapport à l'année 2009 (20.8 nouveaux cas pour 100.000), le cancer du poumon reste prédominant chez l'homme.
- Le cancer colorectal reste le deuxième cancer masculin et son incidence connaît une augmentation régulière. Une étude sur les facteurs de risque de ce cancer serait très utile.
- Le cancer de la prostate, devenu troisième cancer masculin depuis quelques années, connaît une progression rapide.
- La diminution de l'incidence du cancer de la vessie est-elle une tendance épidémiologique lourde ou un simple « effet-année » ?




Cancers les plus fréquents chez l'homme Alger 2010

➤ **LES CANCERS CHEZ LA FEMME**

- ✓ 2589 nouveaux cas, soit 55.7 % des tumeurs malignes, basocellulaires exclus, ont été diagnostiquées chez les femmes.
- ✓ l'âge médian est à 50 ans, soit 10 ans avant les hommes
- ✓ 25 cas sont d'âge inconnu (1%) ;
- ✓ 3.1% des cas ont été notifiés sur certificats de décès.
- ✓ **L'incidence brute annuelle est de 163.7 nouveaux cas pour 100.000 femmes**

• Répartition des cas par tranche d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 0-4	•	23	•	0.9	•	0.9
• 5-9	•	11	•	0.4	•	1.3
• 10-14	•	14	•	0.5	•	1.8
• 15-19	•	31	•	1.2	•	3
• 20-24	•	52	•	2	•	4.9
• 25-29	•	83	•	3.1	•	8.1
• 30-34	•	116	•	4.4	•	12.4
• 35-39	•	184	•	6.9	•	19.4
• 40-44	•	300	•	11.3	•	30.7
• 45-49	•	318	•	12	•	42.7
• 50-54	•	310	•	11.7	•	54.3
• 55-59	•	286	•	10.8	•	65.1
• 60-64	•	231	•	8.7	•	73.8
• 65-69	•	192	•	7.2	•	81
• 70-74	•	186	•	7	•	88.1
• 75+	•	291	•	11	•	99
• Age inconnu	•	26	•	1	•	100
• Total	•	2654				




Cancers femme: répartition par tranches d'âges Alger 2010

- L'âge médian de survenue des cancers, tous sites confondus, chez les femmes est 50ans

Principales localisations des cancers féminins en 2010

<i>localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence relative%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standard</i>
Sein	1033	39.9	65.3	65.62
Colon-rectum	264	10.2	16.7	18.35
Thyroïde	165	6.4	10.4	9.54
Col utérin	137	5.3	8.7	9.74
Ovaire	86	3.3	5.4	5.81
Système hématopoïétique	86	3.3	5.4	8.87
cerveau	86	3.3	5.4	6.41
Estomac	67	2.6	4.2	4.5
Peau	61	2.4	3.9	4.04
Corps utérin	58	2.2	3.7	4.07
Vésicule biliaire	57	2.2	3.6	4.19




Cancers les plus fréquents chez la femme Alger 2010

- Le cancer de la thyroïde est, depuis plusieurs années maintenant, le troisième cancer féminin, avant même le cancer du col utérin dont l'incidence connaît une baisse légère mais constante.

➤ Le cancer du sein féminin

Effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 15-19	•	2	•	0.2	•	0.2
• 20-24	•	6	•	0.6	•	0.8
• 25-29	•	20	•	1.9	•	2.7
• 30-34	•	46	•	4.5	•	17.3
• 35-39	•	105	•	10.2	•	35.5
• 40-44	•	188	•	18.2	•	53.9
• 45-49	•	190	•	18.4	•	67.7
• 50-54	•	142	•	13.7	•	77.4
• 55-59	•	101	•	9.8	•	82.9
• 60-64	•	56	•	5.4	•	88.7
• 65-69	•	60	•	5.8	•	93.6
• 70-74	•	51	•	4.9	•	99.6
• 75+	•	62	•	6	•	100
• Age inconnu	•	4	•	0.4		
• Total	•	1033				



**Cancer du sein féminin Incidences brutes par tranches d'âges
Alger 2010**

On note un rajeunissement de l'âge médian (40-44 ans) pour ce cancer, avec une ascension de la courbe d'incidence à partir de 39 ans et un premier pic d' incidence (208.3) à 49 ans. Le deuxième pic se situe à 74 ans avec 218.9 nouveaux cas pour 100.000 femmes.

➤ **LES CANCERS DE L'ENFANT :**

- 82 nouveaux cas de cancers chez les garçons de 0-15 ans (3.9% des cancers) et 48 cas chez les filles (1.8%).
- **Incidences brutes et standardisées les plus fréquentes observées chez les garçons de moins de 15 ans :**

<i>Localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
Hémopathies malignes	27	32.9	8.4	2.6
Cerveau	15	18.3	4.7	1.5

Incidences brutes et standardisées les plus fréquentes observées chez les filles moins de 15 ans :

<i>Localisation</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Fréquence%</i>	<i>Incidence brute</i>	<i>Incidence standardisée</i>
Cerveau	16	33.3	5.2	1.68
Hémopathies malignes	12	25	3.9	1.24

Les cancers du cerveau et les hémopathies malignes occupent la première place parmi les cancers chez l'enfant.

POPULATION DE BOUMERDES : Année 2010

Population totale : 773.426

Nombre des hommes : 395.513

Nombre des femmes : 377.923

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	305.07	290.13
5-9	321.62	303.24
10-14	348.42	331.65
15-19	415.26	400.11
20-24	445.44	422.08
25-29	430.48	410.87
30-34	354.53	339.75
35-39	291.27	272.45
40-44	264.72	244.52
45-49	218.67	200.20
50-54	182.59	168.64
55-59	135.09	127.26
60-64	7840	8204
65-69	5365	6339
70-74	4640	5057
+75	6352	7233
Total	395.513	377.923

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2008 DANS LA WILAYA DE BOUMERDES :

Caractéristiques générales des cancers

- 667 nouveaux cas de cancers, basocellulaires inclus, ont été notifiés pour l'année 2010 dans la wilaya de Boumerdes, dont :
- 321 nouveaux cas masculins : 48.1 %des tumeurs malignes.
- 346 cas féminins : 51.9% des tumeurs malignes.
- Le sex ratio est de 0.93

Proportions de cas confirmés histologiquement :


	<i>Pathologie de tumeur primitive</i>	<i>Pathologie de métastase</i>
Hommes	83.5%	1.9%
Femmes	88.4%	1.2%

LES CANCERS CHEZ LES HOMMES:

- 321 nouveaux cas : 48.4% des tumeurs.
- 3 cas sont d'âge inconnu (0.9%)
- 2.8 % des cas notifiés sur certificat de décès chez les hommes
- **L'incidence annuelle brute est de 77.6 nouveaux cas pour 100.000 hommes**

Répartition des cas par tranches d'âge :


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 0-4	•	4	•	1.2	• 1.2
• 5-9	•	4	•	1.2	• 2.5
• 10-14	•	2	•	0.6	• 3.1
• 15-19	•	3	•	0.9	• 4
• 20-24	•	3	•	0.9	• 5
• 25-29	•	10	•	3.1	• 8.1
• 30-34	•	9	•	2.8	• 10.9
• 35-39	•	19	•	5.9	• 16.8
• 40-44	•	17	•	5.3	• 22.1
• 45-49	•	12	•	3.7	• 25.9
• 50-54	•	22	•	6.9	• 32.7
• 55-59	•	46	•	14.3	• 47
• 60-64	•	40	•	12.5	• 59.5
• 65-69	•	47	•	14.6	• 74.1
• 70-74	•	26	•	8.1	• 82.2
• 75+	•	54	•	16.8	• 99.1
• Age inconnu	•	3	•	0.9	• 100
• Total	•	321	•	100	



Cancers Homme: répartition par tranches d'âges
Boumerdes 2010

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les hommes en 2010 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	56	18.2	14.2	20.68
Colon-rectum	37	12.1	9.4	13.91
Système hémato poïétique	33	10.7	8.3	11.1
Prostate	29	9.4	7.3	11.3
Estomac	24	7.8	6.1	8.97
Peau	18	5.9	4.6	5.79
Vessie	15	4.9	3.8	4.63
cerveau	13	4.2	3.3	4.68
rhinopharynx	11	3.6	2.9	3.3
pancréas	10	3.3	2.5	3.34




**Cancers les plus fréquents chez l'homme
Boumerdes 2010**

LES CANCERS CHEZ LES FEMMES :

- 346 nouveaux cas : 51.9% des tumeurs.
- 3 cas d'âge inconnu (0.9%)
- 1.4% des cas notifiés sur certificat de décès
- L'incidence annuelle brute est de 89.2 nouveaux cas pour 100.000 femmes.
- Répartition par tranches d'âge :

Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	•	% cumulés
• 0-4	•	2	•	0.6	•	0.6
• 5-9	•	1	•	0.3	•	0.9
• 10-14	•	4	•	1.2	•	2
• 15-19	•	5	•	1.4	•	3.5
• 20-24	•	9	•	2.6	•	6.1
• 25-29	•	17	•	4.9	•	11
• 30-34	•	19	•	5.5	•	16.5
• 35-39	•	30	•	8.7	•	25.1
• 40-44	•	33	•	9.5	•	34.7
• 45-49	•	44	•	12.7	•	47.4
• 50-54	•	43	•	12.4	•	59.7
• 55-59	•	34	•	9.8	•	69.7
• 60-64	•	26	•	7.5	•	77.2
• 65-69	•	24	•	6.9	•	84.1
• 70-74	•	11	•	3.2	•	87.3
• 75+	•	41	•	11.8	•	99.1


• Age inconnu	• 3	• 0.9	• 100
• Total	• 346	• 100	



**Cancers Femmes: incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes 2010**

Incidences brutes et incidences standardisées les plus élevées chez les femmes en 2010 :


localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	112	33.2	29.6	30.68
Colon-rectum	33	9.8	8.7	10.92
Col utérin	24	7.1	6.4	7.66
Vésicule biliaire	21	6.2	5.6	6.54
Thyroïde	19	5.6	5	5.09
Système hématopoïétique	16	4.7	4.2	4.99
Estomac	13	3.9	3.4	4.51
Ovaire	10	3	2.6	2.98
cerveau	10	3	2.6	2.92
Peau	9	2.7	2.4	1.51



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Boumerdes 2010**

Cancer du sein féminin : effectifs et fréquences cumulées par tranche d'âge :

<i>Tranches d'âges</i>	<i>Effectifs</i>	<i>%</i>	<i>% cumulés</i>
20-24	2	1.8	1.8
25-29	4	3.6	5.4
30-34	8	7.1	12.5
35-39	14	12.5	25
40-44	19	17	42
45-49	26	23.2	65.2
50-54	16	14.3	79.5
55-59	10	8.9	88.4
60-64	5	4.5	92.9
65-69	1	0.9	93.8
70-74	1	0.9	94.6
75+	5	4.5	99.1
99	1	0.9	100
Total	112		



**Cancer du sein féminin : Incidences brutes par tranches d'âges
Boumerdes2010**

LES CANCERS DE L'ENFANT

- 17 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez l'enfant en 2010, soit 2.5 % des cancers
- 10 cas sont survenus chez les garçons (3.1% des cancers masculins)
- 7 cas chez les filles (2% des cancers féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de boumerdes chez les garçons moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence %	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	3	30	3.1	1.02
Hémopathies malignes	2	20	2.1	0.66

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la willaya de boumerdes chez les filles moins de 15 ans :

Localisation	effectifs	fréquence %	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	2	28.57	2.16	0.6
os	2	28.57	2.16	0.68

POPULATION DE TIPAZA: Année 2010

Population totale : 606.738

Nombre des hommes : 307.861

Nombre des femmes : 298.895

Tranches d'âge	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	252.99	243.43
5-9	253.76	245.18
10-14	256.79	248.02
15-19	297.68	288.88
20-24	335.26	322.11
25-29	344.43	329.12
30-34	305.06	296.15
35-39	229.87	226.73
40-44	203.30	195.05
45-49	158.26	150.38
50-54	134.43	130.44
55-59	109.67	101.26
60-64	6969	6833
65-69	4520	4952
70-74	3516	3744
+75	4705	5690
Total	307.861	298.895

NOUVEAUX CAS DE CANCERS ENREGISTRES EN 2010

Caractéristiques générales des cancers dans la wilaya de Tipaza

- 492 nouveaux cas de cancers enregistrés en 2010, basocellulaires inclus.
- 215 nouveaux cas chez les hommes, soit 43.5 % des tumeurs.
- 277 nouveaux cas soit 56.5% des tumeurs

Proportions de cas confirmés histologiquement :


	Pathologie de tumeur primitive%	Pathologie de métastase %
Hommes	80.3	3.8
femmes	88.9	0.7

LES CANCERS CHEZ LES HOMMES :

- 208 nouveaux cas (basocellulaires exclus) soit 45 % des tumeurs
- 2 cas d'âge inconnu (1%)
- 1.9 % de cas notifiés sur certificat de décès uniquement
- **L'incidence annuelle brute est de 67.6 nouveaux cas pour 100.000 hommes**

Répartition des cas par tranches d'âge :


Tranches d'âges	•	Fréquences	•	%	% cumulés
• 0-4	•	6	•	2.8	• 2.8
• 5-9	•	2	•	0.9	• 3.7
• 10-14	•	4	•	1.9	• 5.6
• 15-19	•	5	•	2.3	• 7.9
• 20-24	•	6	•	2.8	• 10.7
• 25-29	•	5	•	2.3	• 13
• 30-34	•	5	•	2.3	• 15.3
• 35-39	•	7	•	3.3	• 18.6
• 40-44	•	11	•	5.1	• 23.7
• 45-49	•	12	•	5.6	• 29.3
• 50-54	•	12	•	5.6	• 34.7
• 55-59	•	19	•	8.8	• 57.7
• 60-64	•	30	•	14	• 71.6
• 65-69	•	30	•	14	• 82.3
• 70-74	•	23	•	10.7	• 99.1
• 75+	•	36	•	16.7	• 100
• Age inconnu	•	2	•	0.9	
• Total	•	215			



**Cancers Hommes: incidences brutes par tranches d'âges
Tipaza 2010**

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les hommes Tipaza 2010:

localisation	Effectifs	Fréquence relative	Fréquence cumulée	Incidence brute	Incidence standard
Poumon	31	14.9		10.07	15.9
Système hématopoïétique	27	13		8.77	11.1
Colon-rectum	22	10.6		7.14	11.3
Peau	15	7.2		4.87	7.9
Cerveau	13	6.25		4.22	4.6
Vessie	13	6.25		4.22	7.6
Prostate	13	6.25		4.22	7
Estomac	12	5.77		3.90	6.7
Rhinopharynx	9	4.33		2.92	2.9
larynx	6	2.88		1.95	2.8




**Cancers les plus fréquents chez l'homme
Tipaza 2010**

LES CANCERS CHEZ LES FEMMES

- 270 nouveaux cas soit 57.9 % des tumeurs (basocellulaires exclus).
- 3 cas d'âge inconnu (1.1%).
- 0.4 % de cas notifiés sur certificat de décès uniquement.
- **L'incidence annuelle brute est de 90.3 nouveaux cas pour 100.000 femmes**

• Répartition des cas par tranches d'âge


Tranches d'âges	• Fréquences	• %	% cumulés
• 0-4	• 2	• 0.7	• 0.7
• 5-9	• 2	• 0.7	• 1.5
• 10-14	• 1	• 0.4	• 1.9
• 15-19	• 5	• 1.9	• 3.7
• 20-24	• 5	• 1.9	• 5.6
• 25-29	• 12	• 4.4	• 10
• 30-34	• 8	• 3	• 13
• 35-39	• 16	• 5.9	• 18.9
• 40-44	• 39	• 14.4	• 33.3
• 45-49	• 30	• 11.1	• 44.4
• 50-54	• 43	• 15.9	• 60.4
• 55-59	• 28	• 10.4	• 70.7
• 60-64	• 26	• 9.6	• 80.4
• 65-69	• 12	• 4.4	• 84.8
• 70-74	• 18	• 6.7	• 91.5
• 75+	• 20	• 7.4	• 98.9
• Age inconnu	• 3	• 1.1	• 100
• Total	• 270	• 100	




Cancers tous sites : incidences brutes par tranches d'âges Femmes Tipaza 2009

Incidences brutes et incidences standard les plus élevées chez les femmes - Tipaza 2010 :

localisation	Effectifs	Fréquence relative%	Fréquence Cumulée%	Incidence brute	Incidence standard
Sein	122	45.2	45.2	40.8	43.6
Colon rectum	23	8.5	53.7	7.7	9.2
Col utérin	22	8.1	61.8	7.4	9.8
Système hématopoïétique	18	6.7	68.5	6	7.5
Corps utérin	9	3.3	71.8	3	4.1
rhinopharynx	6	2.2	74	2	2.7
Thyroïde	6	2.2	76.2	2	2.1
peau	6	2.2	78.4	2	2.5
Estomac	5	1.9	80.3	1.7	2
Vésicule biliaire	5	1.9	82.2	1.7	2.5



**Cancers les plus fréquents chez la femme
Tipaza 2010**



**Cancer du sein féminin – Incidences brutes par tranches d'âges
Tipaza2010**

LES CANCERS DE L'ENFANT

- 17 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés chez les moins de 15 ans, soit 3.6 % des cancers enregistrés dans la wilaya
- 12 nouveaux cas chez les garçons (5.8% des cas masculins)
- 5 nouveaux cas chez les filles (1.9% des cas féminins)

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les garçons moins de 15 ans :

Localisation	Effectifs	Fréquence%	Incidence brute	Incidence standardisée
Cerveau	5	41.7	6.5	2.2
Hémopathies malignes	2	16.7	2.6	11.1
rétinoblastome	2	16.7	2.6	1.8

Incidences brutes et standardisées les plus fréquents observées dans la wilaya de Tipaza chez les filles moins de 15 ans :

Localisation	effectifs	fréquence	Incidence brute	Incidence standardisée
cerveau	2	40	2.7	1.3
Hémopathies malignes	2	40	2.7	0.8

ALGER –HOMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010

Localisation	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et +	In B
	140	C00	3									0.7			1.3					3.8	
	141	C01	2													1.7		3.5			
et n. précisées	141	C02	5											1.1		1.7		7		3.8	
	143	C03	2	1												1.7					
	144	C04																			
	145	C05																			
et non précisées	145	C06																			
	142	C07	7										0.9			1.7	4.9	3.5	4.7	3.8	
aut. Et non précisées	142	C08	4											1.1		1.7	2.4		4.7		
	146	C09																			
	146	C10																			
	147	C11	81	1	0.9		1.9	0.7	0.6	0.5	2.2	7.9	3.6	13.4	1.6	1.0	1.7	2.8	9.3	1.9	
	148	C12	1																4.7		
	148	C13	1																	3.8	
pharynx	149	C14	2													3.3					
	150	C15	17						0.5	0.5		0.9			4	1.7		1.4	4.7	1.9	
	151	C16	94	3						1	1.1	1.4	6.2	1.1	1.2	11.7	24.3	3.5	79.1	91.1	
	152	C17	7									0.7		2.2	4		2.4				
	153	C18	142	2		1			0.6	1.5	1.6	7.9	7.1	14.5	1.6	28.5	48.5	45.5	55.8	98.7	
enne	154	C19	30								1.1	0.7	1.8	4.5	6.7	8.4	7.3	1.4	9.3	7.6	
	154	C20	80					0.6		1.6	3.6	2.7	7.8	10.7	8.4	1.7	4.9	37.2	72.1		
	154	C21	3	1												1.7	2.4				
hépatiques	155	C22	29		0.9						0.5	0.7	0.9	2.2	2.7	3.3	7.3	1.4	4.7	41.7	
	156	C23	22								0.5			1.1		3.3	12.1	17.5	9.3	22.8	
précisées	156	C24	5												2.7	1.7			4.7	3.8	
	157	C25	46	1								0.7	1.8	2.2	6.7	11.7	26.7	24.5	9.3	30.4	

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

aut.et mal définis	159	C26	6											1.1		3.3	24		9.3		
moyenne	160	C30	5													3.3	24		4.7	3.8	
	160	C31	3										0.9				24			3.8	
	161	C32	55	2										2.2	6.7	10	19.4	28	51.2	49.3	
	162	C33																			
	162	C34	289	2						0.5	2.7	3.6	10.7	20.1	40	46.9	111.6	185.6	218.7	159.4	
	164	C37	3					0.7							1.3		24				
plèvre	164	C38	13						1.1		0.5					3.3	9.7	10.5	4.7		
TES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	In B
tra thoraciques	165	C39	1																	3.8	
re des membres	170	C40	20			1	1	2.2	0.6	2	0.5	2.1		2.2			24	3.5	4.7	3.8	
e, aut. , n. précisée	170	C41	18			2.9	1.9		0.6			0.7	2.7		1.3		24	3.5	9.3	11.4	
g)	169	C42	76	1	2.6	11.7	1	3	0.6	1.5	1.1	2.1	2.7	6.7	10.7	8.4	4.9	10.5	37.2	41.7	
peau	172	C43																			
a peau (baso exclus)	173	C44	93						1.1	1.5	2.7	2.1	2.7	4.5	13.3	15.1	9.7	31.5	83.8	87.3	
ystème nerveux	171	C47																			
oine	158	C48	7									0.7				3.3	4.9	3.5	4.7		
s tissus mous	171	C49	6								0.5	0.7	0.9			1.7	2.4	3.5			
	175	C50	35								0.5	2.1	2.7	6.7	5.3	6.7	2.5	10.5	14	26.6	
	187	C60	1														2.4				
	185	C61	226	5							0.5			1.1	5.3	26.8	77.6	115.6	176.8	364.3	
	186	C62	16		2.6				1.7		0.5	2.1	1.8	1.1		1.7		7			
culins a. n. p.	187	C63																			
	189	C64	33	3	7	2.9						0.7		3.4	5.3		2.4	10.5	14	11.4	
	189	C65																			
	189	C66																			
	188	C67	165	9	0.9				0.6	0.5	1.6	0.7	2.7	5.6	1.6	21.8	3.4	112.1	74.5	204.9	
, non précisées	188	C68	3														2.4	3.5	4.7		
	190	C69	2		0.9															3.8	
	191	C70	16		0.9						1.1	0.7	0.9	4.5	1.3		4.9	14			
	192	C71	84	1	7.9	2.9	2.9	1.5	2.3	2	3.3	3.6	6.2	11.2	4	15.1	12.1	17.5	27.9	7.6	
crâniens, autres	192	C72																			
	193	C73	37						2.3	1.5	2.7	2.1	2.7	6.7	8	3.3	4.9	10.5		3.8	
	194	C74	2		0.9											1.7					
es	194	C75	4			2.9	1														
finis		C76	9		0.9	1	1				1.1			1.1		1.7			4.7	3.8	
es s. et n. précisée	196	C77	91	2	0.9	2.9	6.7	3.7	6.8	3	2.7	2.1	9.8	10.1	9.3	11.7	9.7	7	9.3	19	
précisé	199	C80	106	3		1	1.9	0.7		1.5	1.1	0.7	8	10.1	13.3	8.4	41.2	31.5	41.9	94.9	
(ires exclus)			2008	37	27.3	30.2	19.3	12.5	19.5	19	31.7	51.1	81.3	149.6	223.9	298.1	543.3	875.3	1033.6	1525.8	
cellulaires			107	1		1		0.7	1.1	0.5	0.5	2.1	3.6	9	12	18.4	21.8	42	83.8	98.7	
res inclus			2115	38	27.3	31.2	19.3	13.2	20.6	19.5	32.2	53.2	84.9	158.6	235.9	316.5	565.1	917.3	1117.4	1624.5	

**ALGER –FEMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR
TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010**

TES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	In B
	140	C00																			
	141	C01																			
t n. précisées	141	C02	5						0.6								2.4			9	
	143	C03																			
	144	C04																			
	145	C05																			
et non précisées	145	C06	1											1.1							
	142	C07	6							0.5	0.6			1.1	2.5					3	
aut. Et non précisées	142	C08	1								0.6										
	146	C09	1												1.3						

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

	146	C10																			
	147	C11	24	1				1.5	0.6	1.5	0.6	1.5	1.8	22	1.3	4.9	24	6.8		9	
	148	C12	1													1.6					
	148	C13																			
pharynx	149	C14																			
	150	C15	13							1		1.5		22	3.8		24		4.3	6	
	151	C16	67	1				0.8		1.5	1.1	3	1.8	5.5	8.8	11.5	12	23.7	25.7	50.8	
	152	C17	14					0.8			0.6		1.8	2.2		3.3	2.7	6.8	4.3	6	
	153	C18	152	2			1		0.6	1.5	2.9	6.8	11.1	13.2	21.3	23.1	40.7	6.1	55.7	83.7	
enne	154	C19	41	1							0.6		4.6		3.8	16.5	14.3	16.9		29.9	
	154	C20	71	1				0.8		1.5	1.7	0.8	6.5	6.6	3.8	8.2	21.5	27.1	34.3	47.8	
	154	C21	9	1									1.8	2.2	1.3	1.6			4.3	3	
hépatiques	155	C22	26		0.9								0.9	2.2	1.3	13.2	12	6.8	4.3	14.9	
	156	C23	57	1								0.8	2.8	3.3	8.8	16.5	14.3	16.9	55.7	23.9	
précisées	156	C24	4												1.3	1.6	2.4			3	
	157	C25	26									1.5		4.4	3.8	3.3	4.8	16.9	25.7	6	
aut.et mal définis	159	C26	5											1.1	1.3		2.4	6.8			
moyenne	160	C30	3														2.4	3.4		3	
	160	C31	4							0.5	0.6		1.8								
	161	C32	4											1.1		3.3		3.4			
	162	C33	1										0.9								
	162	C34	50	1		1				0.5	1.1	0.8	2.8	2.2	1.3	1.6	12	30.5	34.3	29.9	
	164	C37	5					1.5	0.6		0.6	0.8									
plèvre	164	C38	4				1		1.2						1.3						
ITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	In B
ra thoraciques	165	C39																			
re des membres	170	C40	11					0.8		1.5		0.8			1.3	4.9	2.4	3.4			
aut.,n. précisée	170	C41	14		2.8			0.8	1.2	0.5	1.7			1.1	2.5				4.3		
	169	C42	49	1	3.7	2	1	2.3	0.6	0.5	1.7	0.8	2.8	2.2	2.5	6.6	16.7	16.9	21.4	14.9	
eau	172	C43																			
peau (baso exclus)	173	C44	61	1				2.3	1.7	0.5	1.1	1.5	5.5	4.4	6.3	11.5	14.3	16.9	12.9	38.9	
tème nerveux	171	C47																			
ne	158	C48	9								0.6				3.8		2.4	3.4	8.6	3	
tissus mous	171	C49	1												1.3						
	174	C50	1033	4				1.5	3.5	10.2	26.4	79.8	173.4	208.3	178.2	166.5	133.9	203.2	218.6	185.4	
	184	C51	6													4.9		3.4	8.6		
	179	C52	6															3.4		14.9	
	180	C53	137								2.3	1.5	6.5	21.9	26.4	46.2	50.2	30.5	34.3	50.8	
	182	C54	58	1								2.3	3.7	6.6	7.5	23.1	14.3	10.2	38.6	17.9	
cisée	179	C55	2													1.6	2.4				
	183	C56	86				2		2.3	1	1.7	6.8	8.3	2.2	21.3	16.5	31.1	13.5	30	12	
ins au. n. p.	184	C57	1													1.6					
	181	C58																			
	189	C64	22	3	2.8	1				0.5					3.8	1.6	14.3	3.4	4.3	6	
	189	C65																			
	189	C66																			
	188	C67	33								0.6	0.8	1.8	3.3		3.3	12	6.8	17.1	38.9	
non précisées	188	C68																			
	190	C69	3			1			0.6											3	
	191	C70	18					0.8			0.6		1.8	3.3	1.3	3.3	4.8	6.8	12.9	3	
	192	C71	86		6.4	6.1		1.5	2.9	2	2.3	3	3.7	11	10	14.8	26.3	23.7	4.3	3	
âniens, autres	192	C72	3					0.8			0.6		0.9								
	193	C73	165	2			1	1.5	5.2	7.1	9.2	16	23.1	18.6	18.8	29.7	21.5	16.9	21.4	17.9	
	194	C74	1								0.6										
	194	C75	3					0.8			0.6				1.3						
nis	-	C76	7		1.8					0.5	0.6								3.4	8.6	
s. et n. précisée	196	C77	86	2			5	3	7	6.1	4	4.6	2.8	6.6	11.3	3.3	16.7	6.8	17.1	14.9	
précisé	199	C80	93	2	2.8			2.3	1.7	2.5	1.1	3	2.8	8.8	13.8	13.2	21.5	20.3	38.6	50.8	
es exclus)			2589	25	21.2	11.1	14	23.8	30.3	41.4	66.1	138.4	275.7	348.9	384.6	462.8	533.2	619.9	750.2	804.2	

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

cellulaires	65							0.5	0.6	1.5	0.9		5	8.2	19.1	30.5	47.2	65.8	
s inclus	2654	25	21.2	11.1	14	23.8	30.3	41.9	66.7	139.9	276.6	348.9	389.6	471	552.3	650.4	794.4	870	

Boumerdes –HOMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00																				
Base de la langue	141	C01																				
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	1													74					03	03
Gencive	143	C03																				
Plancher de la bouche	144	C04																				
Palais	145	C05																				
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06																				
Glande parotide	142	C07																				
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08																				
Amygdales	146	C09	2								28			46							05	05
Oropharynx	146	C10																				
Rhinopharynx	147	C11	11							23	28		76	46	11	148	128	186			28	33
Sinus piriforme	148	C12																				
Hypopharynx	148	C13																				
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14																				
Oesophage	150	C15	1																	157	03	03
Estomac	151	C16	24									34	189	46		444	51	932	216	157	6.1	9
Intestin grêle	152	C17	3								28					74			216		08	09
Côlon	153	C18	24							23	28	34	38		164	148	765	559	43.1	63	6.1	9.1
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	6									34	38				128	186	216	15.7	1.5	22
Rectum	154	C20	7									69			55	74	128	373			1.8	26
Canal anal	154	C21																				
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	2														128		216		05	09
Vésicule biliaire	156	C23	2												55		128				05	08
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	2															186		15.7	05	09
Pancréas	157	C25	10									34			11	148	128		43.1	31.5	25	33
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26																				
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30																				
Sinus de la face	160	C31																				
Larynx	161	C32	6											46			128	746			1.5	3
Trachée	162	C33																				
Bronches et poumon	162	C34	56									34	38	137	274	888	1148	1118	1078	2204	14.2	20.7
Thymus	164	C37	2							23			38								05	04
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	1																216		03	04

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

[illegible]

Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39																			
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40	5								10.3					128			15.7	1.3	1.4
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	3			29					34			5.5						0.8	0.7
Hématopoïétique (sang)	169	C42	14			29			23				46	5.5		128	111.8	21.6	31.5	3.5	5.9
Mélanome malin de la peau	172	C43																			
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	18					22	23	28	6.9	7.6			22.2	25.5	18.6	64.7	31.5	4.6	5.8
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47																			
Rétro péritoine , péritoine	158	C48																			
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	1									3.8								0.3	0.2
Sein masculin	175	C50	5									7.6				128			31.5	1.3	1.6
Verge	187	C60																			
-Prostate	185	C61	29												44.4	38.3	93.2	86.2	173.2	7.3	11.3
Testicule	186	C62	1									3.8								0.3	0.2
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63																			
Rein sans bassinnet	189	C64	4												14.8		18.6		15.7	1	1.5
Bassinnet	189	C65																			
Urètre	189	C66																			
Vessie	188	C67	15	2					23		6.9		4.6	5.5			55.9	43.1	47.2	3.8	4.6
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68																			
Oeil et annexes	190	C69	1		3.3															0.3	0.4
Méninges	191	C70	1		3.3															0.3	0.4
Cerveau	192	C71	13		3.3	6.2		24	22					16.4	7.4	25.5	37.3			3.3	4.7
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72	1														18.6			0.3	0.6
Thyroïde	193	C73	5							28	6.9							21.6	15.7	1.3	1.3
Surrénale	194	C74																			
Aut. glandes endocrines	194	C75	1			3.1														0.3	0.3
Autres sièges et mal définis		C76	1			3.1														0.3	0.3
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	19		3.3			4.8	22	9.3	5.6	3.4		4.6		29.6		37.3		15.7	4.8
t. maligne de siège non précisé	199	C80	10	1										9.1		7.4	25.5	37.3		31.5	2.5
Tous sites (basocellulaires exclus)		307	3	13.2	12.4	5.8	7.2	6.6	23.1	22.4	61.7	64.5	55	109.7	325.6	485.1	857.2	539.2	786.9	78.3	108.7
Peau:Carcinomes basocellulaires		14								28	3.4			11	14.8	25.5	18.6	21.6	63	160.7	4.8
Tous sites basocellulaires inclus		321	3	13.2	12.4	5.8	7.2	6.6	23	25.2	65.1	64.5	55	120.7	340.4	510.6	878.8	560.8	849.9	239	113.5

Boumerdes –FEMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010[illegible]

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

[illegible][illegible]

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

Hématopoïétique (sang)	169	C42	7														122	31.6		555.3	1.9	25
Mélanome malin de la peau	172	C43																				
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	9					24					5	5.9	7.9				55.3	24	25	
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47																				
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	4											17.8				19.8		1.1	1.3	
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49	1					24												0.3	0.2	
Sein	174	C50	112	1				4.7	9.7	23.5	51.4	77.7	129.9	94.9	78.6	60.9	15.8	19.8	69.1	29.6	30.7	
Vulve	184	C51																				
Vagin	179	C52																				
Col utérus	180	C53	24							5.9	7.3	16.4	15	17.8	23.6	36.6	47.3		13.8	6.4	7.7	
Corps de l'utérus	182	C54	4										5	5.9	7.9	122				1.1	1.4	
Utérus et partie non précisée	179	C55																				
Ovaire	183	C56	10				25		4.9			8.2		11.9	7.9	122	15.8			2.6	3	
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57																				
Placenta	181	C58																				
Rein sans bassinnet	189	C64	2	1										5.9						0.5	0.3	
Bassinnet	189	C65																				
Uretere	189	C66																				
Vessie	188	C67	3											11.9				19.8		0.8	1	
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68																				
-Œil et annexes	190	C69	1		3.4															0.3	0.4	
Méninges	191	C70	3						24		3.7	4.1								0.8	0.7	
Cerveau	192	C71	10			3.3	3		24	24			10		7.9	122			13.8	2.6	2.9	
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72																				
Thyroïde	193	C73	19				5	24	24	8.8	3.7	8.2	5	11.9	7.9	244			41.5	5	5.1	
Surrénale	194	C74																				
Aut. glandes endocrines	194	C75	3				3									122	15.8			0.8	1.2	
Autres sièges et mal définis	-	C76	1															13.8		0.3	0.3	
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	9						4.9	2.9	3.7		5	5.9	7.9		15.8		13.8	24	24	
t. maligne de siège non précisé	199	C80	13				3		24		3.7	4.1	10	5.9	7.9	122	47.3		13.8	34	4.3	
Tous sites (basocellulaires exclus)			337	3	6.6	3.3	12	125	21.5	41.2	55.7	110.2	135.1	214.9	254.8	244.1	317.1	347.2	197.8	538.9	89.4	99.7
Peau:Carcinomes basocellulaires			9										5		23.6		31.6	19.8	27.7	24	3.1	
Tous sites basocellulaires inclus			346	3	6.6	3.3	12	125	21.5	41.2	55.7	110.2	135.1	219.9	254.8	267.7	317.1	378.8	217.6	566.6	91.8	102.8

TIPAZA-HOMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00																				
Base de la langue	141	C01																				
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02																				
Gencive	143	C03																				
Plancher de la bouche	144	C04																				
Palais	145	C05																				
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06																				
Glande parotide	142	C07	1										4.9								0.3	0.3
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08																				
Amygdales	146	C09																				
Oropharynx	146	C10																				
Rhinopharynx	147	C11	9				3.9	3.4				4.4			14.9	9.1	14.3	44.2			2.9	3.9
Sinus piriforme	148	C12																				
Hypopharynx	148	C13																				
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14																				
Oesophage	150	C15	2																	42.5	0.6	0.8
Estomac	151	C16	12										4.9		7.4	18.2	14.3	44.2	85.3	42.5	3.9	6.7
Intestin grêle	152	C17																				
Côlon	153	C18	10										4.9	6.3	14.9		14.3	66.4	28.4	21.3	3.2	5.3
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	2															44.2			0.6	1.3
Rectum	154	C20	10									8.7	4.9	6.3	7.4	9.1	14.3	44.2	28.4		3.2	4.7
Canal anal	154	C21	1											6.3							0.3	0.4
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22	2															22.1		21.3	0.6	1.1
Vésicule biliaire	156	C23	3	1													14.3			21.3	1	1
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24	3							2.9								22.1	28.4		1	1.7
Pancréas	157	C25	5							2.9							4.3		28.4		1.6	2.8
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26																				
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30	1																	21.3	0.3	0.4
Sinus de la face	160	C31																				
Larynx	161	C32	6												7.4		28.7			63.8	1.9	2.8
Trachée	162	C33																				
Bronches et poumon	162	C34	31							2.9	3.3	4.4	4.9	12.6	14.9	27.4	86.1		110.6	106.3	10.1	15.9
Thymus	164	C37	2						3	2.9											0.6	0.5
Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38	1																	21.3	0.3	0.4

SITES	9 ^{ème}	10 ^{ème}	Tous	âge	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75	Incidence	Incidence
-------	------------------	-------------------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----------	-----------

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

	CIM	CIM	âges	ind.															et+	Brute	standard	
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39																				
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40																				
Os, cartilage articulaire, aut. , n. précisée	170	C41	5				39		3					74	9.1		22.1			1.6	2	
Hématopoïétique (sang)	169	C42	14			39		34	6				98	6.3		182	442	284	425	4.5	5.9	
Mélanome malin de la peau	172	C43																				
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	15	1									19		9.1			1422	1063	4.9	7.9	
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47																				
Rétro péritoine , péritoine	158	C48																				
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49																				
Sein masculin	175	C50	1														22.1			0.3	0.7	
Verge	187	C60																				
-Prostate	185	C61	13										6.3		9.1	86.1	22.1	284	63.8	42	7	
Testicule	186	C62	1							3.3										0.3	0.2	
Organes génitaux masculins a. n. p.	187	C63																				
Rein sans bassinnet	189	C64																				
Bassinnet	189	C65																				
Urètre	189	C66																				
Vessie	188	C67	13										6.3	74		28.7	132.7	284	425	42	7.6	
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68																				
Oeil et annexes	190	C69	3		7.9													284		1	1.8	
Méninges	191	C70	3							3.3		4.9			9.1					1	0.8	
Cerveau	192	C71	13		11.9	3.9	3.9	6.7	3	3.3	8.7	4.9				14.3				4.2	4.6	
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72																				
Thyroïde	193	C73	1												9.1					0.3	0.4	
Surrénale	194	C74																				
Aut. glandes endocrines	194	C75																				
Autres sièges et mal définis		C76																				
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	13		4				3	29	3.3	44	98			182	28.7		284	21.3	4.2	5.2
t. maligne de siège non précisé	199	C80	12				39	34						6.3	74	182		22.1	284	85	3.9	54
Tous sites (basocellulaires exclus)			208	2	23.8	7.8	15.6	16.9	18	14.5	16.5	30.6	53.9	75.7	89.1	163.9	387.1	663.3	625.3	723	67	99.3
Peau:Carcinomes basocellulaires			7													9.1	43		284	42.5	2.3	3.5
Tous sites basocellulaires inclus			215	2	23.8	7.8	15.6	16.9	18	14.5	16.5	30.6	53.9	75.7	89.1	173	430.1	663.3	653.7	765.5	69.3	102.8

TIPAZA-FEMMES: TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2010

SITES	9ème CIM	10ème CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00																				
Base de la langue	141	C01																				
Langue, parties autres et n. précisées	141	C02	1													99					0.3	0.4
Gencive	143	C03																				
Plancher de la bouche	144	C04																				
Palais	145	C05																				
Bouche , parties autres et non précisées	145	C06																				
Glande parotide	142	C07																				
Glandes salivaires prin., aut. Et non précisées	142	C08																				
Amygdales	146	C09																				
Oropharynx	146	C10																				
Rhinopharynx	147	C11	6									4.4			7.7		29.3		26.7	17.6	2	2.7
Sinus piriforme	148	C12																				
Hypopharynx	148	C13																				
Lèvre, cavité buccale et pharynx	149	C14																				
Osoophage	150	C15	3							3	3.4				7.7						1	0.8
Estomac	151	C16	5						3.1						7.7	99		202		17.6	1.7	2
Intestin grêle	152	C17	1																	17.6	0.3	0.3
Côlon	153	C18	9										5.1	6.6	7.7		29.3	202		52.7	3	3.9
Jonction recto-sigmoïdienne	154	C19	2									4.4		6.6							0.7	0.7
Rectum	154	C20	12						3.1				15.4	13.3	15.3	19.8	14.6		26.7		4	4.6
Canal anal	154	C21																				
Foie, voies biliaires intra hépatiques	155	C22																				
Vésicule biliaire	156	C23	5											15.3			14.6	202	26.7		1.7	2.5
Voies biliaires, aut. non précisées	156	C24																				
Pancréas	157	C25	4													9.9	29.3		26.7		1.3	2.1
Organes digestifs, sièges aut.et mal définis	159	C26	1															202			0.3	0.6
Fosses nasales et oreille moyenne	160	C30																				
Sinus de la face	160	C31																				
Larynx	161	C32																				
Trachée	162	C33																				
Bronches <i>et</i> poumon	162	C34	2																26.7	17.6	0.7	0.9
Thymus	164	C37																				

Cœur et médiastin de la plèvre	164	C38																				
--------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	Age Ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	Incidence Brute	Incidence standard
Ap. respiratoire , or. intra thoraciques	165	C39																				
Os et cartilage articulaire des membres	170	C40																				
Os, cartilage articulaire, aut.,n. précisée	170	C41	3										5.1						26.7	17.6	1	12
Hématopoïétique (sang)	169	C42	12		4.1		4	3.5					5.1		7.7	19.8	43.9	40.4			4	5.6
Mélanome malin de la peau	172	C43																				
Autres t. malignes de la peau (baso exclus)	173	C44	6			4.1			3.1						7.7				53.4	17.6	2	2.5
Nerfs périphériques, système nerveux	171	C47																				
Rétro péritoine , péritoine	158	C48	3							6.1			5.1								1	0.8
Tissu conjonctif, autres tissus mous	171	C49																				
Sein	174	C50	122	2					3.1	18.2	20.3	57.3	133.3	159.6	130.3	108.6	102.4	80.8	80.1	35.1	40.8	43.6
Vulve	184	C51	1													9.9					0.3	0.4
Vagin	179	C52																				
Col utérus	180	C53	22										10.3	6.6	38.3	39.5	87.8		53.4	35.1	7.4	9.8
Corps de l'utérus	182	C54	9												30.7	19.8	29.3	20.2			3	4.1
Utérus et partie non précisée	179	C55																				
Ovaire	183	C56	3							3						9.9			26.7		1	1.2
Organes génitaux féminins au. n. p.	184	C57																				
Placenta	181	C58																				
Rein sans bassinet	189	C64	3							3			5.1		7.7						1	0.9
Bassinets	189	C65																				
Uretere	189	C66																				
Vessie	188	C67	4																26.7	52.7	1.3	1.6
Organes urinaires, au. , non précisées	188	C68																				
-Œil et annexes	190	C69																				
Méninges	191	C70	3										10.3		7.7						1	1
Cerveau	192	C71	3		4.1	4.1														17.6	1	1.3
Moelle épinière nerfs crâniens, autres	192	C72																				
Thyroïde	193	C73	6									4.4			15.3	9.9				35.1	2	2.1
Surrénale	194	C74																				
Aut. glandes endocrines	194	C75	1																26.7		0.3	0.5
Autres sièges et mal définis	-	C76	1					3.5													0.3	0.3
Ganglions lymphatiques s. et n. précisée	196	C77	6				10.4	3.1						6.6						17.6	2	1.9
t. maligne de siège non précisé	199	C80	11	1						3	3.4		5.1		23	9.9		20.2	53.4		3.7	4
Tous sites (basocellulaires exclus)			270	3	8.2	8.2	4	17.4	15.5	36.3	27.1	70.5	199.9	199.3	329.8	276.8	380.5	242.4	480.6	351.5	90.1	104.5

Registre des Tumeurs d'Alger Année 2010

Peau: Carcinomes basocellulaires	7													0.3			1	1	2.3	0.1
Tous sites basocellulaires inclus	277	3	82	82	4	17.4	15.5	36.3	27.1	70.5	199.9	199.3	329.8	277.1	380.5	242.4	481.6	352.5	92.4	104.6

Nous remercions les Professeurs, Chefs des services suivants ainsi que leurs assistants et collaborateurs sans lesquels ce travail n'aurait pu se faire :

Messieurs les professeurs, chefs de services de :

SERVICE	NOM DU MEDECIN CORRESPONDANT DU REGISTRE
HÔPITAL DE AIN TAYA	
GYNÉCOLOGIE	PR GUERROUMI
PÉDIATRIE	PR KERMANI
MEDECINE INTERNE	PR BIAD
CHIRURGIE GÉNÉRALE	PR DJILLALI
CENTRE PIERRE ET MARIE CURIE (CPMC)	
ONCOLOGIE	PR BOUZID
CHIRURGIE FEMME	PR GRABA
CHIRURGIE HOMME	PR GRABA
GYNECOLOGIE	PR GRABA
ENDOCRINOLOGIE	PR SEMROUNI
RADIOTHERAPIE	PR AFIANE
HEMATOLOGIE	PR HAMLADJI
CYTOLOGIE	PR ZIDANE ET DR BOUGRINA
ANAPATH	PR TERKI
HOPITAL MUSTAPHA	
ANAPATH	PR ASSELAH
PNEUMO-PHTISIOLOGIE	PR NAFTI PR MAKHLOUFI
CARDIOLOGIE A	PR MERED
CARDIOLOGIE B	PR CHITOUR
C.C.A.	PR HAMAD
C.C.B	PR BOUSSAFAR
CHIRURGIE MAXILO FACIALE	PR HAFIZ
CHIRURGIE THORACIQUE	PR CHAOUCHE
DERMATOLOGIE	PR BENKAID ALI
GASTRO-ENTEROLOGIE	PR BOUSEKINE
GYNECOLOGIE	PR ADDAD
MEDECINE INTERNE	PR ARADA
MEDECINE LEGALE	PR MEHDI
NEUROCHIRURGIE	PR DJENAS
NEUROLOGIE	PR TAZIR
OPHTALMOLOGIE	PR HARTANI
O.R.L.	PR DJENAOUI
ORTHOPIDIE	PR NOUAR
PEDIATRIE CCI	PR LADJADJ
PEDIATRIE CMI	PR KEDARI / PR MERTANI
REANIMATION URGENCE	PR GUERINIK
UROLOGIE	PR SEDDIK
PSYCHIATRIE	PR ARIBI

HOPITAL DE BAB EL OUED

CHIRURGIE
NEURO CHIRURGIE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
NEUROLOGIE
MEDECINE INTERNE
OPHTALMOLOGIE
O.R.L.
ORTHOPEDIE
PEDIATRIE
UROLOGIE
RHUMATOLOGIE
MATERNITE GYNECOLOGIE
PNEUMOPHTISIOLOGIE
ANAPATH

PR BEKADA HADJ BELMEHMEL
PR BENBOUZID
PR BOUADJAR

PR MAKMOUCHE
PR MASMOUDI
PR BERRAH
PR HARTANI
PR SELMANE
PR BENBAKOUCHE
PR LARABA / PR ANANE
PR ADJALI KAMEL
PR ABTROUN SABIRA
PR CHEIKH EL GHANAMI
PR AMRANE
PR BABA AHMED

Hôpital de Béni Messous:

CHIRURGIE INFANTILE
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
OPHTALMOLOGIE
O,R,L,
PNEUMOLOGIE A
PÉDIATRIE A
PÉDIATRIE B
MÉDECINE INTERNE
NÉPHROLOGIE
HÉMATOLOGIE
RHUMATOLOGIE
E,F, RESPIRATOIRE
ANATOMIE PATHOLOGIE

PR HANTALA
PR LADJALI
PR TIDJANI PR OUHADJ
PR ZEMIRLI DR AIZEL
PR ZIDOUNI
PR KHIARI
PR BENSNOUSSI
PR YOUNSI
PR BENABADJI
PR BELHANI
PR BAYOU / DR MOSTEFAI
PR SKENDER
PR BENDISSARI

C.H.U. BOLOGHINE

MEDECINE INTERNE
GYNECOLOGIE
PEDIATRIE
CHIRURGIE

PR ASSELAH

PR BAGHRICH
PR ABID

C.H.U. ZERALDA

GYNECOLOGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
CHIRURGIE GENERALE

DR AYACHE
DR LARRAS

C.H.U. DOUERA

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
ORTHOPEDIE
CHIRURGIE PLASTIQUE
RHUMATOLOGIE

PR CHIRK
PR KRIM
PR MEKHALDI
PR DJOUGDAR
PR SAIRI

ANAPATH
MAXILO FACIAL

PR OUAHYOUNE
PR AMICHI

HÔPITAL ZEMERLI

CHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
NEUROCHIRURGIE
ORTHOPÉDIE
RADIOLOGIE

PR HIRECHE
PR CHAHI
PR ABDENEBBI
PR NEDJAH

HÔPITAL PARNET

GYNÉCOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
PÉDIATRIE
NEPHROLOGIE

PR BOUZEKRINI
PR CHACHOUA
PR SALEM
PR LABIAD, PR BERRAH
PR RAYAN

HOPITAL DE KOUBA

MEDECINE INTERNE
O.R.L.
CHIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE

PR TOUCHENE
PR YAH
PR MAAOUI
PR DJENAOUI

HOPITAL DE ROUBA

CHIRURGIE
MÉDECINE INTERNE
PNEUMOLOGIE

PR ZEBOUDJ
PR BENFENADKI
PR ALLOULA

PEDIATRIE

DR BOUKHANFOUF

C.H.U. BELFORT

GYNECOLOGIE
PEDIATRIE
C.C.I.
UNITE DE CYTOLOGIE

PR DJENAOUI
PR KHIATI
PR DJIDJLI
DR AGGAL

HOPITAL BIRTRARIA

MÉDECINE INTERNE
PÉDIATRIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CHIRURGIE GÉNÉRALE

PR BROURI
PR ACHIR
DR YOUYOU
PR OULMANE

CLINIQUE DES ORANGERS

CHIRURGIE
GASTRO-ENTÉROLOGIE

PR AIT BENAMAR
DR MAHINDAD

HOPITAL BEN AKNOUN

RHUMATOLOGIE
ORTHOPÉDIE
NEUROLOGIE

PR CHAOUCHE
PR BENBOUZID
DR AOUAMER

HOPITAL AIT IDIR

NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE

PR IOUALALENE
PR KACI

HOPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE (HCA)

MEDECIN CHEF
CHIRURGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE MAXILLO PHACIALE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE
HEMATOLOGIE
NEPHROLOGIE
NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE
O.R.L
MEDECINE INTERNE

PNEUMO PHTISIOLOGIE
RADIOThERAPIE
ONCOLOGIE
PEDIATRIE
ORTHOPEDIE TRAUMATAU
PATHOLOGIE
UROLOGIE
MEDECINE LEGALE

SECTEUR PRIVE

LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH

LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH
LABORATOIRE D'ANAPATH

PR BERCHICHE
PR TOUATI
PR KHELIFAOUI
PR GUEDOUAR
PR DJRIDANE
PR KEMALI
DR BOUSLOUB
PR CHAIBI
PR ARDJOUNE
PR IFTANE
PR ADJEMI
PR MESSAOUDI
DR SMAILI
PR TALBI DR GASMI

PR AOUICHET
PR MEKKI DR TAYEB
PR SEDOUKI PR KANOUNE PR KALAIN
PR BERAH
PR MAMERI/ PR AZIZI
DR KACIMI
PR SOUID / PR LOUNISSI
DR AOUNI

PR KACI
DR DJOUMI
DR BOUABANE
DR HADADJ
DR SAIDI - ROUIBA
DR MORSLI – EL HARRACH

DR ABANE
DR BOUHALISSA
DR BENHAMDINE

C.P.DERMATOLOGIE
C.P.DERMATOLOGIE
C.P.DERMATOLOGIE
C.P.DERMATOLOGIE
C.P.CHIRURGIE GENERALE
C.P.OPHTALMOLOGIE
C.P.DERMATOLOGIE
C.P.UROLOGIE
C.P.GYNECOLOGIE
C.P.CHIRURGIE GENERALE

DR AHMED YAHIA
DR AIT MOKHTAR
DR BELAROUSSI
DR MAICH
DR IMOULOUDENE
DR GARIDI
DR ISMAIL DAHLOUK
PR BENALOUANE
DR BENAIBOUCHE
PR BOUDIAF

CLINIQUE DEBUSSY

CNAS

DR HAMMOUCHE

E.P.H BORDJ MENAIL

ONCOLOGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
CHIRURGIE GENERALE
O.R.L
OPHTALMOLOGIE
GYNECOLOGIE

DR ABED BEN MALHA
DR CHAIB
DR AIT OUHAMOU
DR MAZOUZ/ DR MESSAOUDI
DR SIOUANI

DR THAMRI

E.P.H DELLYS

CHIRURGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE

DR CHAIB
DR RAHMANI
DR ABTROUN
DR RABIA DR TERKI
DR SAID

GYNECOLOGIE

E.P.H.THENIA

GYNECOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
NEPHROLOGIE
MEDECINE INTERNE
ONCOLOGIE

DR BELGUEMBOUR

PR OUKIL DR SAID
DR BELAMEI
DR ABERKANE

OPHTALMOLOGIE

DR SADOUNI DR HACHOUCHE

PEDIATRIE
ANAPATH
ORTHOPEDIE

DR AOUDIA
DR BELBEGRA

EPH KOLEA

CHIRURGIE
PEDIATRIE
GYNECOLOGIE

DR SAADI
DR BELOUIZDAD
Dr AITBDELMALEK

EPH HADJOUT

PNEUMOLOGIE
CHIRURGIE
GYNECOLOGIE
MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE

DR RENNOU
DR HADI
DR BETAHAR
DR SERHANE
DR ATIF

EPH GOURAYA

MEDECINE INTERNE
PEDIATRIE
GYNECOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE

DR BRAHMI
DR ZATAL
DR AMOURI
DR BOULEKRAF

EPH SIDI GHILES

ONCOLOGIE
MEDECINE INTERNE
CHIRURGIE
CYTOLOGIE
PEDIATRIE
ORTHOPEDIE
UMC

DR LAOUAR
DR LARAoui
DRBENACHOUR

DR MELZI
DR RIAD
DR BRAHMI

N.B : Les services hospitaliers consultés sont si nombreux que nous pouvons avoir omis de citer certains d'entre eux. Si tel est le cas, nous leur demandons par avance de nous excuser et nous les remercions de bien vouloir nous le signaler afin qu'une telle omission ne se reproduise plus.

